

아나파치TM정 (디오스민)

고압방으로
먹는
치질약

치열·치핵
통증 및 가려움
부종·출혈의 완화
정맥부전(다리통증)

일반의약품 정보		1. 정맥부전과 관련된 증상의 개선: 다리 중압감, 통증 2. 모세혈관 취약증에 의한 정맥의 보조치료 3. 치질과 관련된 징후의 치료
【유효성분】	1정 중	【용법·용량】 정맥부전: 디오스민으로서 1회 600mg 1일 1회 식사시 복용한다. 치질·디오스민으로서 1회 600mg 1일 2~3회(1,200~1,800mg) 식사시 복용한다. ↓
디오스민(EP).....	600mg	
【효능·효과】	→	

일반의약품 정보 (계속됨)		이 약을 투약해도 다른 항문 질환에 대한 특별한 치료법이 면제되지 않는다. 이 약은 오랜 기간 투약하지 말아야 한다. 증상이 빨리 나아지지 않으면, 항문검사를 실시해야 하며 치료를 재검토해야 한다.
【사용상의 주의사항】		
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1) 이 약 성분에 과민증이 있는 환자 2) 수유부		5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것 임부(필요한 경우에만 이 약 투여가 고려되어야 한다.)		
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것 상당시 가능한한 이 첩부문서를 소지할 것 이 약 투여 후 소화장애가 나타날 수 있으나, 치료를 중단하는 경우는 드물다.		【저장방법】
4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 →		밀폐용기, 실온보관(1~30°C)
		【사용기한】
		용기 하단 표기일까지(순서·연월일) ↓

일반의약품 정보 (계속됨)		분홍 또는 연분홍의 원형 필름코팅정제
【첨가제】		■ 제조원: 삼진제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 52 - 제조의뢰자 품질무약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단 3길 120 - 제조자 ※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2022년 03월 28일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr) 또는 소비자상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 부작용보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223) ※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.
첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산, 오파드라이 분홍색(03B640092), 오파드라이 E클리어(253U190007), 글로이드성아산화규소, 탈크		
【성상】		→