

고함량으로 먹는 치질약

일반의약품

아나파치정TM (디오스민)

■ 원료약품 및 그 분량: 1정 중

유효성분: 디오스민(EP) 600 mg
첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이분홍색(03B640092), 오파드라이EZ클리어(253U190007), 저지완도하드록시프로필셀룰로오스

■ 성상: 분홍 또는 연분홍의 장방형 필름코팅정제

■ 효능·효과

1. 정맥부전과 관련된 증상의 개선: 다리 중압감, 통증
2. 모세혈관 취약증에 의한 장폐의 보조치료
3. 치질과 관련된 징후의 치료

■ 용법·용량

정맥 부전: 디오스민으로서 1회 600 mg 1일 1회 식사 시 복용한다.
치질: 디오스민으로서 1회 600 mg 1일 2~3회(1,200 ~ 1,800 mg) 식사 시 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 수유부
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
임부(필요한 경우에만 이 약 투여가 고려되어야 한다.)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
이 약 투여 후 소화장애가 나타날 수 있으나, 치료를 중단하는 경우는 드물다.
4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
이 약을 투약해도 다른 항문 질환에 대한 특별한 치료법이 면제되지 않는다.
이 약은 오랜 기간 투약하지 말아야 한다.
증상이 빨리 나아지지 않으면, 항문검사를 실시해야 하며 치료를 재검토해야 한다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

■ 저장방법: 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

■ 포장단위: 30 정/병

■ 제조원: 삼진제약(주)·경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 52(제조의뢰자) 풍림무약(주)·경기도 화성시 향남읍 제약공단 3길 120(제조자)

※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2025년 05월 19일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr) 또는 소비자상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 사용기한이 경과되었거나 변질·변색·오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.

※ 의사·약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

※ 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.