

일반의약품

조제용

칼슘 및 비타민D의 보급

# 칼슘마정

500정



한국신텍스제약(주)

KOREA SYNTEX PHARMACEUTICAL

【원료약품의 분량】 1정(779mg) 중

■ 유효성분 : 시트르산칼슘수화물(USP)(칼슘으로서158.1mg) ... 750mg  
농축콜레칼시페롤(EP)(비타민D(으)로서 400 I.U) ... 4mg

■ 기타첨가제 : 콜로이드성이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘

【성상】 흰색의 장방형 정제

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민D의 보급

- 임신·수유기, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
  - 뼈, 이의 발육불량 • 구루병의 예방

2. 칼슘결핍 및 기타 칼슘의 보급

【용법·용량】 만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 2정을 식후 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자 5) 심한 증상의 신부전 환자 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 3) 심장·순환기계기능 장애 환자 4) 신장장애 환자 5) 저단백혈증 환자 6) 강심배당체를 투여 중인 환자 7) 신장결석 병력이 있는 환자 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 구역, 구토, 설사, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동 불규칙, 구역, 구토, 피부발진 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장

증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다. 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 5) 우발적으로 과량복용 한 경우 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정/병, 60정/병, 100정/병, 300정/병, 500정/병

【제조사】 한국신텍스제약(주) / 전라북도 익산시 삼기면 산단오롱길 106

【소비자상담실】 063-853-8110

【의약품정보참조】 <https://nedrug.mfds.go.kr>

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환하여 드립니다.

※ 의약품의 정상적인 사용에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.

개정일 20220203

KGMP 우수의약품 지정업체

재활용 보통



제조번호

(01)08806230068351 사용기한

40x20mm