

※ 의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하세요.

고함량 셀레늄·아연·비타민B1 함유 제품

일반의약품

Maxelen-BZ Tab.

맥세렌비제트정

Selenium 200µg
Zinc 50mg
Vitamin B1 3.6mg

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1정(324.5mg) 중

유효성분 : 아셀렌산나트륨오산화물(EP) 0.666mg
(셀레늄(으)로서 200 µg)
산화아연(KP) 62.244mg
(아연(으)로서 50mg)
벤포티아민(KP)(티아민염산염(으)로서 3.6mg) 5.000mg

※ 동물유래성분 : 셀락토스(소 / 우유)

※ 기타 첨가제 : 경질무수구산, 수크랄로스, 스테아르산마그네슘, 시트르산나트륨,
오마드라이핀색(03B28796), 크로스카멜로오스나트륨, 크로스포비돈,
포비돈, D-만니톨

【성상】

흰색의 양면이 볼록한 원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 B1 의 보급

- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시

2. 아연의 보급

【용법·용량】

만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

- 2) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
구역, 구토, 묽은 변, 피부염, 부·호흡기 약취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 3) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 5) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것(용기 등에 표시가 잘 되어있어 오용할 소지가 없을 경우에는 기재하지 않아도 된다.).

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 21 정/피티피, 42 정/피티피, 63 정/피티피

【재조변호】 용기에 별도표시

【사용기한】 제조일로부터 36 개월

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변색 또는 오손된 제품을 구입하신 경우 병·의원, 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 최초제조일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.mcnutlypharma.com) 또는 전화(031-378-1460)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 영어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생시 한국의약품안전관리원(14-3330)에 피해구제신청을 할 수 있습니다.

최초제정일자: 2022.03.07

MBZ-2203-00

제조사

 **McNulty**
맥널티제약

충청남도 천안시 서북구 성환읍 울금3길 46
www.mcnutlypharma.com