

종근당 비타민씨 골드정 1000mg

일반의약품

아스코르브산97%과립

제품정보 QR코드



이 약을 복용하기 전에 동봉된 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 약과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 분량]

1정(1,145mg) 중 유효성분 : 아스코르브산97%과립(별규) 1,030.93mg (아스코르브산(으)로서 1,000 mg) 기타첨가제: 미 결정셀룰로오스, 스테아르산칼슘, 저치환도히드록시프로필 셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소

[성상] 흰색의 장방형 정제

[효능·효과]

1. 과혈병의 예방과 치료

2. 비타민 C의 요구량이 증가하는 소모성 질환

- 임신, 수유 및 병중 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
- 육체피로

3. 다음 질환 중 비타민 C 결핍으로 추정되는 경우

- 잇몸출혈, 비출혈(코피), 혈뇨 등의 모세관출혈
- 햇빛, 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)
- 흡수불량

[용법·용량]

성인: 아스코르브산으로서 보통 500~1,000mg을 1일 1회 또는 수회 분할하여 복용하십시오.

-충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에는 과민반응 환자
- 고수산노증(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태), 지중해빈혈증 환자
- 통풍 환자 및 시스틴노증 환자
- Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) 결핍환자 : 고용량을 투여할 경우 용혈을 초래할 수 있습니다.
- 신장(콩팥)의 수산결석(수산칼슘돌) 환자 : 1일 1g 이상 투여할 경우

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

- 임신 중, 고용량을 투여할 경우, 신생아의 과혈병을 초래할 수 있으므로 주의하십시오.
- 과도한 음주나 흡연을 삼가하십시오.

- 이 약은 충분한 물과 함께 복용하도록 하며 이 약과 식도점막과의 접촉시간이 길어지면 식도염을 일으킬 수 있으므로 복용 후, 바로 눕지 않도록 합니다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

1) 임부·수유부

2) 신장(콩팥)의 수산결석(수산칼슘돌) 환자

3) 경구용 항응고제(쿠마린계 약물)를 복용 중인 환자(경구용 항응고제의 반응을 약화시킬 수 있습니다.)

4) 살리실산염, 아스피린, 철분제, 페니토인 및 일부 항진균제, 에스트로겐이 포함된 경구용 피임약, 타트라싸이클린계 항생제, 플루페나진, 오리스타트르를 복용 중인 환자(바람직하지 않는 상호작용을 초래할 수 있습니다.)

5) 바르비탈산 유도체를 복용 중인 환자(이 약의 신장(콩팥)배설을 촉진합니다.)

6) 코르티코스테로이드제를 복용 중인 환자(이 약의 산화를 증가시킵니다.)

7) 흡연자, 만성적으로 알코올을 섭취하는 사람

4. 다음과 같은 경우, 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 구역, 구토, 설사, 속쓰림
- 안면(얼굴)홍조, 두통, 불면
- 과광투여로 인한 신장(콩팥)결석, 요의 산성화, 수산염 결석의 침전

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 투여하십시오.
- 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 각종 요양검사시 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.
- 오(잘못 사용)·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위하여 다른 용기에 넣지 마십시오.

[주의] 1. 개봉 후에는 타제품과의 혼입 및 혼용이 되지 않도록 주의하십시오. 2. 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오. 3. 제품 개봉시 또는 취급시 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 200 정/상자 (100정(10정/PTPX10)X2)

[소비자상담실] 080-6776-080(수신자부담)

구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 때는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오. 이 약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다. KGMP(우수약품) 제조 및 품질관리기준 적격업소 제품 101

제조의뢰자 :



종근당



충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48
구입처문의 및 소비자상담실 : 080-6776-080(수신자부담)

제조사 :

한국코러스(주)

충청북도 제천시 강제로 30

소비자중심경영
공정거래위원회 | 한국소비자원

※ 제품 사용 후 이상반응(부작용)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

이 첨부문서 작성일자(2022.02.23)이후 변경된 내용은 종근당 인터넷 홈페이지(www.ckdpharm.com)나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.