

치질치료에 빠른

치킵²정

일반의약품

미세정제
플라보노이드
분획물

제품정보 QR코드



이 약을 복용하기 전에 동봉된 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 약과 함께 보관하십시오.

【원료약품의 분량】 1정(710mg) 중 유효성분:

미세정제플라보노이드분획물 500mg(별규), 첨가제(타르색소): 황색203호, 황색4호, 황색5호, 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탈크, 탭실드주황색(110361), 탭실드흰색(11W375), 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 주황색의 장방형 필름코팅정제**【효능·효과】** 1. 정맥염파부전: 하지부종, 통증, 초기욕창 2. 치질**【용법·용량】** 1. 정맥질환에는 1일 2회, 1회 1정을 아침, 저녁 식사시 복용합니다. 2. 급성치질에는 처음 4일간은 1일 2회, 1회 3정을, 이후 3일간은 1일 2회, 1회 2정을 아침, 저녁에 복용합니다.**【사용상의 주의사항】****1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오.**

주성분과 첨가제에 대해 과민반응을 가지고 있는 환자

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

1) 모유 수유: 활성 물질/대사 산물이 모유로 분비되는지에 대해 알려져 있지 않고, 신생아/영아에 대한 위험성 또한 배제 할 수 없습니다. 수유부 투약 여부 또는 수유 중단여부 결정은 수유의 유익성과 수유부 치료의 유익성을 고려하여 결정되어야 합니다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 임신부에게 미세정제플라보노이드분획물을 사용한 연구는 없거나 제한적입니다. 동물시험에서 생식독성은 나타나지 않았습니다. 예방 차원에서 임신 중에 사용을 피하는 것이 바람직합니다.
- 2) 기압력: 동물을 이용한 생식독성 시험에서 수태능(임신능력)에의 영향은 없었습니다.
- 3) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
이상반응 발현(드러나 보임)빈도는 매우 흔하게($\geq 1/10$); 흔하게($\geq 1/100$, $< 1/10$); 때때로($\geq 1/1,000$, $< 1/100$); 드물게($\geq 1/10,000$, $< 1/1,000$); 매우 드물게($< 1/10,000$), 빈도 불명(활용한 정보로부터 추산이 불가능함)로 구분하였습니다.
- (1) 신경계: 드물게 현기증, 두통, 권태감이 나타날 수 있습니다.

제조의회사 :



중 군 당

충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48

구입처문의 및 소비자상담실 : 080-6776-080(수신자부담)

※ 제품 사용 후 이상반응(부작용)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

이 첨부문서 작성일자(2022.06.08) 이후 변경된 내용은 중군당 인터넷 홈페이지(www.ckdpharm.com)나 소비자 상담담당(080-6776-080)을 통해 확인할 수 있습니다.

(2) 위장관계: 흔하게 설사, 소화불량, 오심, 구토가 나타날 수 있고, 때때로 대장염이 나타날 수 있으며, 빈도 불명으로 복통이 나타날 수 있습니다.

(3) 피부 및 파하(피부발)조직: 드물게 발진, 가려움, 두드러기가 나타날 수 있고, 빈도불명으로 얼굴, 입술, 눈꺼풀의 부종, 예외적으로 켄케부종이 나타날 수 있습니다.

(4) 급성 치질에 이 약의 대증적증상에 대응하여) 치료는 다른 항문 증상의 치료를 방해하지 않습니다. 치료는 단계적으로 이루어져야 하고, 증상이 신축이 진정되지 않으면, 체계적인 검사야 행해져야하고 치료가 재검토 되어야 합니다.

(5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

(6) 이 약은 황색4호(타르타린)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

- 1) 약물상호작용에 관한 연구는 수행되지 않았지만, 현재까지 시판 후 조사에서 임상적으로 약물상호작용을 보이는 약물은 보고되지 않았습니다.
- 2) 과광투여: 이 약의 과광 투여 사례는 제한적이나 빈번하게 보고된 부작용은 위장관 증상(설사, 오심, 복통)과 피부 증상(소양증, 발진) 등이 있습니다. 과광투여 시, 대증요법(증상치료)을 사용해야 합니다.
- 3) 운전 및 기계 조작에의 영향: 이 약의 운전 및 기계 조작에의 영향에 관한 연구는 수행되지 않았지만, 이 약의 전반적 안전성 정보를 감안할 때, 이 약의 운전 및 기계 조작에의 영향은 없거나 무시할 만합니다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 대로(습기가 적고) 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내서 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용) 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【주의】

1. 개봉 후에는 타제품과의 혼합 및 혼용이 되지 않도록 주의하십시오.
2. 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
3. 제품 개봉시 또는 취급시 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온($1\sim 30^{\circ}\text{C}$)보관**【포장단위】** 30정/상자(10정/PTP $\times$ 3)

구입시 유효기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준)적격업소 제품 101

제조사 :

태극제약(주)

경기도 화성시 남양읍 제약
공단3길 123충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48
구입처문의 및 소비자상담실 : 080-6776-080(수신자부담)