

■■■ 의약품 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

리버칼에프

연질캡슐

350mg

(밀크시슬열매건조엑스)

일반의약품

고함량 간 기능 개선제

● 원료약품 및 분량 1캡슐 중

- 유효성분 : 밀크시슬열매건조엑스(실리마린으로서 196밀리그램)(생규) 350mg
- 첨가제(타르색소) : 청색1호(브릴리안트블루FCF), 적색40호(알루라레드AC)
- 동물유래성분 : 젤라틴(돼지, 가축)
- 기타첨가제 : 공기름, 아자경화유, 황납, 레시틴, 농글리세린, 비결정성 소르비톨, 에틸바닐린, 산화티탄

● 성상

황갈색의 유상 내용물을 함유한 암적색(검붉은 색)의 장방형 연질캡슐

● 효능·효과

다음 질환의 보조치료 : 독성간질환, 만성간염, 간경변

● 용법·용량

1일 1회, 1회 1캡슐

● 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 임신, 수유부
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 hepat(이차)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 드물게 위통 또는 설사
- 2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

● 저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

● 사용기간

제조일로부터 24개월

● 포장단위

120캡슐/상자(10캡슐/피티피X12)

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.pharvis.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

※ 소비자상담실 : 02)579-6262

본 의약품은 우수 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

작성일자 : LVFC 2022.02.10 (I-220210)

제조의뢰자 (주)한국파비스제약 경기도 안산시 단원구 산단로 83번길 127

제 조 자 (주)알피바이오 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7