

마그랑비

연질캡슐

[제품명] 마그랑비연질캡슐

[유효성분]	이 약 1캡슐(1,865mg) 중
산화마그네슘(KP)	350 mg(마그네슘으로서 211.09 mg)
토코페롤아세테이트(KP)	450 mg(비타민E로서 450 IU)
벤포티아민(KP)	50 mg(티아민염산염으로서 36.15 mg)
리보플라빈(KP)	25 mg
피리독신염산염(KP)	50 mg
시아노코발라민(KP)	0.5 mg(시아노코발라민으로서 500 µg)
v-오리자놀(KP)	5 mg
산화아연(KP)	10 mg(아연으로서 8.03 mg)
셀레늄함유건조효모(별규)	38.462 mg(셀레늄으로서 50 µg)

[기타첨가제] 농글리세린, 레시틴, 산화티탄, 숙산산젤라틴, 치차헙색소, 카카오색소, 콩기름, 폴리소르베이트80, 향납

[성상] 황색의 내용물을 함유한 암갈색의 정방형 연질캡슐

[효능효과]

■ 다음 경우의 비타민E, B₁, B₂, B₆의 보급

- 육체피로, - 임신·수유기, - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시, - 노년기, - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

· 비타민E(“토코페롤아세테이트”) : 말초혈행장애 및 갱년기 시 다음 증상의 완화 : 어깨 목결림, 수족저각·수족냉증(손발이 차가움)

· 비타민B₁(“벤포티아민”) : 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등) · 각기 · 눈의 피로

· 비타민B₂(“리보플라빈”), 비타민B₆(“피리독신염산염”) : 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

■ 아연의 보급 ■ 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법 용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐을 복용하십시오.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 임부
- 9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종(부기)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.

신경·근육통증 및 말초혈행장애 증상 완화제

1회	1일	복용연령
1캡슐	2회	만 12세 이상

- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g 의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy) : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 7) 항알도스테론제, 트리아멘테논과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 8) 우발적으로 과량복용한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피하십시오.
- 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 60캡슐

[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀)

[부작용보고 및 피해구제 신청] 1644-6223(한국의약품안전관리원), 14-3330(피해구제신청 전용번호)

[최신정보 확인방법] 이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.
※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

[작성일자] 2022.05.12

[제조의회사]  동아제약

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로64

공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 200-23(1, 2A, 4A층)

[제조사] (주)알피바이오

경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

MGR120-22E001

