포시로정 5밀리그램/10밀리그램

(다파글리플로진프로판디올수화물)

전문의약품

포시로정 5밀리그램/10밀리그램

(다파글리플로진프로판디올수화물)

전문의약품

경구용 혈당강하제

【원료약품 및 그 분량】 - 1정 중 -

포시로정 5밀리그램

- 유효성분 : 다파글리플로진프로판디올수화물(별규) (다파글리플로진(으로서 5mg) ---------- 6.15mg
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이II스란색(85F92582), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 탤크, D-만니톨

포시로정 10밀리그램

- 유효성분 : 다파글리플로진프로판디올수화물(별규) (다파글리플로진(으로서 10mg) ---------- 12.3mg
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이II스란색(85F92582), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 탤크, D-만니톨

【성 상】

포시로정 5밀리그램 : 노란색의 원형 필름코팅정

포시로정 10밀리그램 : 노란색의 양면이 볼록한 디이아몬드형의 필름코팅정

【효능·효과】

1. 제 2형 당뇨병 이 약은 제 2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 향상시키기 위해 식사요법 및 운동요법의 보조제로 투여합니다.

- 단독요법
- 병용요법

혈당이 충분히 조절되지 않는 제2형 당뇨병 환자 중 식혈관계 질환이 확인되었거나 심혈관계 위험인자가 있는 환자에서 식혈관계 사건 발생에 대한 영향은 '사용상의 주의사항 1. 전문가를 위한 정보 3) 임상시험 정보' 항을 참고합니다.

【용법·용량】

제2형 당뇨병

단독 요법 및 추가 병용요법

이 약의 권장 용량은 단독 요법 및 인슐린 등 다른 혈당 강하제와의 추가 병용 요법에 대하여 1일 1회 10mg입니다. 이 약을 인슐린 또는 설포닐우레아와 같은 인슐린 분비 촉진제와 병용하여 사용하는 경우, 저혈당의 위험을 줄이기 위해 더 낮은 용량의 인슐린 또는 인슐린 분비 촉진제를 고려할 수 있습니다.

초기 병용요법

이전 단뇨병 약물치료를 받은 경험이 없는 경우 메트포르민과 병용투여 시 이 약의 초기 권장용량은 1일 1회 5mg 또는 1일 1회 10mg입니다.

특수 집단

신장애

- eGFR 45 mL/min/1.73m² 미만 : 혈당조절 개선 목적으로 이 약을 투여하는 것은 권장되지 않습니다.
- 투석 중인 환자 : 이 약을 투여하지 않습니다.

간장애

경증 또는 중등증의 간장애 환자에 대한 용량 조절은 필요하지 않습니다. 중증의 간장애 환자에 대하여, 시작 용량은 5 mg이 권장됩니다. 내약성이 양호한 경우, 이 용량은 10mg으로 증가시킬 수 있습니다.

고령자 (≥ 65세)

연령에 근거한 용량 조절은 권장되지 않습니다.

소아

만 18세 미만의 소아에 대한 다파글리플로진의 유효성과 안전성은 확립되지 않았습니다. 관련 자료가 없습니다.

투여방법

이 약은 음식 섭취와 관계없이, 1일 1회 하루 중 언제라도 경구 투여할 수 있습니다. 정제는 통째로 삼켜야 합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 이 약의 주성분 또는 첨가제에 대한 과민반응 병력이 있는 환자

2) 제형 당뇨병 또는 당뇨병성 케톤산증 환자

3) 투석 중인 환자

2. 다음 환자분에는 신중히 투여하십시오.

1) 체액량 감소 및 신기능 장애가 있는 환자에서의 투여

이 약은 중상성 저혈압이나 크레아티닌의 급격하고 일시적인 변화로 나타날 수 있는 혈관 내 혈량 저하를 유발할 수 있습니다. 와곡의 시판후 조사에서 이 약을 포함한 SGLT-2 저해제를 투여한 환자에서 급성 신장손상이 보고되었으며, 일부는 입원과 투석을 필요로 하였습니다. 신기능 장애(eGFR 60mL/min/1.73m² 미만), 고령자, 루프계 이뇨제 등을 사용하고 있는 환자에서 혈량 저하 또는 저혈압 위험이 증가할 수 있습니다. 이러한 특징들을 가진 환자에 대해 이 약의 투여를 시작하기 전 체액량 상태 및 신장 기능에 대한 평가기 필요하며, 투여를 시작한 후 저혈압 증상 및 징후와 신기능에 대해 모니터링 합니다.

혈압 조절에 대한 이 약의 유효성은 신장 기능에 따라 다릅니다. 중등도의 신장애가 있는 환자에서 혈압 조절 목적으로 이 약을 투여하는 것은 권장되지 않습니다(임상 · 약물 항 참조). 중등도의 신장애 환자에서, 이 약을 투여한 피험자들은 위약을 투여한 피험자들에 비해 크레아티닌, 인, 부갑상샘 호르몬(PTH) 상승 및 저혈압의 이상반응을 나타내는 비율이 더 높았습니다.

3. 이상반응

1) 인전성 프로파일의 요약

제2형 당뇨 환자에 대한 임상 연구에서 15,000명 이상의 환자가 다파글리플로진을 투여받았습니다.

이 약 10mg을 투여한 2,360명 및 위약을 투여한 2,296명이 포함된 12건의 단기 (최장 24주간) 위약 대조 시험에 대한 사전 정의된 통합 분석을 통해 인전성 및 내약성의 평가가 수행된 바 있습니다.

제2형 당뇨병 환자에서 다파글리플로진의 신혈관계 영향을 평가하기 위한 임상시험 (DECLARE: '11. 전문가를 위한 정보, 3) 임상시험 정보'항 참조)에서는 8,574명에게 다파글리플로진 10 mg, 8,569명에게 위약이 투여되었으며 노출 기간의 중앙값은 48개월이었습니다. 총 30,623인-년 (patient-years)의 다파글리플로진 노출이 있었습니다.

임상 연구 전반에 걸쳐 가장 흔하게 보고된 이상반응은 생식기 감염이었습니다.

2) 이상반응 목록

위약 대조 임상 시험에서 아래의 이상반응들이 관찰되었습니다. 용량과 관련된 이상반응은 없었습니다. 아래에 기재된 이상반응은 빈도 및 기관계(SOC)에 따라 분류하였습니다. 발현 빈도는 다음과 같이 정의되었습니다: 매우 흔하게≥ 1/10), 흔하게≥ 1/100 ~ < 1/10), 흔하지 않게≥ 1/1,000 ~ < 1/100), 드물게≥ 1/10,000 ~ < 1/1,000), 매우 드물게(1/10,000), 빈도불명(이용 가능한 자료를 통해 평가할 수 없음).

표 1 위약 대조 시험에서의 이상반응*

기관계	매우 흔하게	흔하게*	흔하지 않게**	드물게	매우 드물게
감염		외음부질염, 귀두염 및 관련 생식기 감염[2a] 요로 감염[2b]	진균감염**		회음부 괴저 (푸르니에 괴저)*
대사 및 영양	저혈당 (설포닐우레아 또는 인슐린과 함께 사용할 때)*		체액량 감소[3]*, 구갈*	당뇨병성 케톤산증 (제2형 당뇨병 환자인 경우)*	
신경계		현기증			
위장관 이상			변비** 구강건조**		
근골격계 및 결합조직		오통			
신장 및 비뇨기계		배뇨통 다뇨*[4]	야간뇨**		간질성 신세뇨관염
생식기계 및 유방			외음부 가려움증** 생식기 가려움증**		
실험실적 수치		헤마토크릿 상승[5] 지질 조기 선정 크레아티닌 청소율 감소[6] 이상지질혈증[7]	지질 조기 혈중 크레아티닌 상승[7a] 혈중 요소 상승* 체중 감소*		

a) 이 표는 혈당 구제에 관계없이, 24주(단기)간까지의 자료를 나타낸 것입니다.

b 추가 정보는 아래 해당하는 단락을 참고합니다.

c 외음부질염, 귀두염 및 관련 생식기 감염은 시전 정의된 선전 용어로서 다음을 포함합니다: 외음질 진균감염, 질염, 귀두염, 생식기 진균감염, 외음질 칸디다증, 외음부질염, 칸디다 귀두염, 생식기 칸디다증, 생식기 감염, 남성 생식기 감염, 음경 감염, 외음염, 세균성 질염, 음문 농양.

d 요로감염은 다음 이상반응을 포함하며, 다만으로 보고된 순서는 다음과 같습니다: 요로감염, 방광염, 대장균요로감염, 비노생식기감염, 신우신염, 방광삼각염, 요도염, 신장감염, 전립선염.

e 체액량 감소는 시전 정의된 선전 용어로서 다음을 포함한다: 탈수, 저혈량증, 저혈압.

f 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 한 심혈관계 영향 평가 임상시험 (DECLARE)으로부터 보고된 것입니다. 빈도는 연간 발생률에 기반합니다.

g 다뇨는 다음의 선호 용어를 포함합니다: 빈뇨, 다뇨, 뇨 배출량 증가.

h 헤마토크릿의 베이스라인으로부터의 평균 변화는 이 약 10mg에서 2.30%, 위약군에서 0.33%였습니다. 헤마토크릿 수치 ≥55%의 변화는 이 약 10mg에서 1.3%, 위약군에서 0.4%로 보고되었습니다.

i 이 약 10mg과 위약을 비교한 베이스라인으로부터의 평균 백분율 변화는 다음과 같습니다: 요오검은 증가, 총 콜레스테롤 2.5% vs 0.0%; HDL 콜레스테롤 6.0% vs 2.7%; LDL 콜레스테롤 2.9% vs −1.0%; 중성지방 −2.7% vs −0.7%.

* 피험자의 2% 이상에서 보고되었으며, 이 약 10mg을 투여한 군에서 위약군에 비해 적어도 39명 더 많은 피험자에게서 1% 이상 더 높은 빈도로 보고되었습니다.

** 연구자에 의해 연관된 것으로(연관되어 있을 가능성이 있는 경우 포함) 보고되었으며, 피험자의 0.2% 이상에서 보고되었으며, 이 약 10mg을 투여한 군에서 위약군에 비하여 적어도 3명 더 많은 피험자에게서 0.1% 이상 더 높은 빈도로 보고되었습니다.

3) 특정 이상반응에 대한 설명

① 외음부질염, 귀두염 및 관련 생식기 감염

임상시험 12건으로부터의 인전성 통합 자료에 따르면 외음부질염, 귀두염 및 관련 생식기 감염은 이 약 10mg 및 위약을 투여한 피험자의 각각 5.5%와 0.6%에서 보고되었습니다. 대부분의 감염은 경증 내지 중등도였고, 피험자들은 최초의 표준 치료에 반응하였으며, 이 약 투여 중단을 야기한 경우는 드물었습니다. 이러한 감염들은 여성에서 더 흔하였으며(이 약 및 위약군에서 각각 8.4%, 1.2%), 과거 병력이 있는 피험자들은 재발성 감염을 나타낼 가능성이 더 높았습니다.

DECLARE 임상시험에서 생식기 감염의 중대한 이상사례가 매우 적었으며 고르게 분포하였습니다 (다파글리플로진 및 위약 군, 각 2명).

DAPA-HF 임상시험에서 생식기 감염의 중대한 이상사례가 다파글리플로진 군에서는 보고되지 않았으며 위약군에서 1명 보고되었습니다. 생식기 감염의 이상사례 때문에 치료를 중단한 환자는 다파글리플로진군에서 1명 (0.3%)이 있었고 위약군에는 없었습니다. 당뇨병이 없는 환자에서 생식기감염의 중대한 이상사례 및 치료 중단으로 이어진 이상사례는 보고되지 않았습니다.

② 저혈당

당뇨병 환자에 대한 임상시험에서 저혈당의 빈도는 각 시험에 사용된 기저 요법의 종류에 따라 좌우되었습니다. 이 약의 단독 투여, 메트포르민 혹은 시전글리딘(메트포르민 단독 혹은 병용)에 대한 추가 병용 연구에서 경미한 저혈당 에피소드의 빈도는 투여 102주까지 위약을 포함한 투여군 간에 유사하였습니다((5%). 이 약과 설포닐우레아 (글리메피리드; 표 6 참조), 인슐린 (단독 또는 경구 혈당 강하제 병용; 표 7 참조), 시타글립틴 (단독 혹은 메트포르민 병용; 표 8 참조), 메트포르민과 설포닐우레아 (표 9 참조), 메트포르민과 삭사글립틴 (표 10 참조) 피오글리타존 (표 11 참조)에 추가 병용하였을 때, 24주에서 위약 대비 통계적으로 유의하게 HbA1c 감소를 나타내었습니다 (p (0.00001).

이 약을 메트포르민에 추가 병용한 시험에서 HbA1c 감소 효과는 102주에서도 유지되었습니다. 글리메피리드에 추가 병용한 시험은 48주, 인슐린에 추가 병용한 시험은 104주까지 연장해도 HbA1c 감소 효과가 유지되었습니다.

표 5 메트포르민 단독요법으로 혈당 조절이 충분하지 않은 환자에서 이 약 추가 병용을 비교한 위약 대조 연구에서, 24주에서의 결과(LOCF*)

유효성 평가변수	메트포르민	
	이 약 10 mg N = 135[a]	위약 N = 135[a]
HbA1c (%) 기저치 (평균)	7.92	8.11
기저치 대비 차이[b]	−0.84	−0.30
위약 대비 차이[c] (95% CI)	−0.54** (−0.74 , −0.34)	
HbA1c (7%)에 도달한 시험대상자의 비율 (%) 기저치에 대해 보정	40.6**	25.9

1 메트포르민≥1500mg/day

a LOCF; Last observation carried forward, 구제치료 전 자료

b 단기 연구 중 1회 이상의 이중맹검 치료를 받은, 모든 무작위 배정 시험대상자

c 기저치에 따라 보정된 최소 제곱 평균 (adjusted LS mean)

* p−value (0.0001

** p−value (0.05

표 6 설포닐우레아 (글리메피리드) 단독요법으로 혈당 조절이 충분하지 않은 환자에서 이 약 추가 병용을 비교한 위약 대조 연구에서, 24주에서의 결과(LOCF*)

유효성 평가변수	설포닐우레아 (글리메피리드)	
	이 약 10 mg N =151[a]	위약 N =145[a]
HbA1c (%) 기저치 (평균)	8.07	8.15
기저치 대비 차이[b]	−0.82	−0.13
위약 대비 차이[c] (95% CI)	−0.68* (−0.86, −0.51)	
HbA1c (7%에 도달한 시험대상자의 비율 (%) 기저치에 대해 보정	31.7*	13.0

1 글리메피리드 4mg/day

a LOCF; Last observation carried forward, 구제치료 전 자료

b 단기 연구 중 1회 이상의 이중맹검 치료를 받은, 모든 무작위 배정 시험대상자

c 기저치에 따라 보정된 최소 제곱 평균 (adjusted LS mean)

* p−value (0.0001

표 7 인슐린 (단독 또는 경구 혈당강하제 병용)으로 혈당조절이 충분하지 않은 환자에서 이 약의 추가 병용을 비교하는 위약 대조 연구에서, 24주에서의 결과 (LOCF*)

유효성 평가변수	인슐린 (단독 또는 경구 혈당강하제 병용)에 추가 병용 요법[a]	
	이 약 10 mg N = 194[a]	위약 N = 193[a]
HbA1c (%) 기저치 (평균)	8.58	8.46
기저치 대비 차이[b]	−0.90	−0.30
위약 대비 차이[c] (95% CI)	−0.60* (−0.74, −0.45)	
1일 평균 인슐린 용량 (IU)[d] 기저치 (평균)	77.96	73.96
기저치 대비 차이[c]	−1.16	5.08
위약 대비 차이[c] (95% CI)	−6.23* (−8.84, −3.63)	
인슐린 1일 용량을 10% 이상 감량한 시험대상자 비율(%)	19.7*	11.0

a LOCF; Last observation carried forward

b 시험대상자의 95%는 인슐린 단독요법; 50%는 인슐린과 1~2종의 경구용 혈당강하제를 병용하고 있었습니다: 후자의 경우, 80%는 메트포르민만 병용하고 있었으며, 12%는 메트포르민과 설포닐우레아를 병용하고 있었고, 그 외의 시험대상자는 다른 종류의 경구용 혈당강하제를 병용하고 있었습니다.

c 단기 연구 중 1회 이상의 이중맹검 치료를 받은, 모든 무작위 배정 시험대상자

d 기저치에 따라 보정된 최소 제곱 평균 (adjusted LS mean)

e 인슐린 (속효성, 중간형, 기저 인슐린 포함) 용량 중간 또는 사전 정의된 FPG 기준에 맞는 시험대상자에 대해서만 하용함.

* p−value (0.0001

** p−value (0.05

표 8 시타글립틴단독요법 혹은 메트포르민 병용으로 혈당 조절이 충분하지 않은 환자에서 이 약의 추가 병용을 비교한 위약 대조 연구에서, 24주에서의 결과 (LOCF*)

유효성 평가변수	시타글립틴[a] ± 메트포르민[b]	
	이 약 10mg N=223[c]	위약 N=224[c]
HbA1c (%) 기저치 (평균)	7.90	7.97
기저치 대비 차이[d]	−0.45	0.04
위약 대비 차이[e]	−0.49* (−0.62, −0.34)	

1 시타글립틴 100mg/day, 2 메트포르민≥1,500mg/day

a LOCF; Last observation carried forward

b 단기 연구 중 1회 이상의 이중맹검 치료를 받은, 모든 무작위 배정 시험대상자

c 기저치에 따라 보정된 최소 제곱 평균 (adjusted LS mean)

* p−value (0.0001

표 9 메트포르민과 설포닐우레아로 혈당 조절이 충분하지 않은 환자에서 이 약의 추가 병용을 비교한 위약 대조 연구에서, 24주에서의 결과

유효성 평가변수	설포닐우레아 + 메트포르민[a]	
	이 약 10 mg N = 108[b]	위약 N=108[b]
HbA1c (%) 기저치 (평균)	8.08	8.24
기저치 대비 차이[c]	−0.86	−0.17
위약 대비 차이[c] (95% CI)	−0.69* (−0.89, −0.49)	
HbA1c (7%에 도달한 시험대상자의 비율 (%) (LOCF*)기저에 대해 보정	31.5*	11.1

1 시험 대상자 선정 이전 적어도 8주동안, 메트포르민 1일 1500 mg 이상과 설포닐우레아의 최대 내약성 용량(1일 최대 용량의 절반 이상)이어야 함)

a 단기 연구 중 1회 이상의 이중맹검 치료를 받은, 모든 무작위 배정 시험대상자

b 경시적 반복 측정 (LRM; Longitudinal repeated measures)

c 기저치에 따라 보정된 최소 제곱 평균 (adjusted LS mean)

d LOCF; Last observation carried forward, 구제치료 전 자료

* p−value (0.0001

표 10 삭사글립틴과 메트포르민으로 혈당 조절이 충분하지 않은 환자에서 이 약의 추가 병용을 비교한 위약 대조 연구에서, 24주에서의 결과

유효성 평가변수	삭사글립틴[a] + 메트포르민[b]	
	이 약 10mg N=180[c]	위약 N=180[c]
HbA1c (%) 기저치 (평균)	8.24	8.16
기저치 대비 차이[d]	−0.82	−0.10
위약 대비 차이[e] (95% CI)	−0.72* (−0.91, −0.53)	
HbA1c (7%에 도달한 시험대상자의 비율 (%) : 기저치에 대해 보정	38.0*	12.4

1 삭사글립틴 5mg/day, 2 메트포르민≥1500mg/day

a 무작위 배정 및 치료받은 환자 중 1회 이상의 이후 유효성 측정이 있었던 환자

b 경시적 반복 측정 (LRM; Longitudinal repeated measures), 구제치료 전 자료

c 기저치에 따라 보정된 최소 제곱 평균 (adjusted LS mean)

* p−value (0.0001

표 11 피오글리타존 혹은 메트포르민 병용으로 혈당 조절이 충분하지 않은 환자에서 이 약의 추가 병용을 비교한 위약 대조 연구에서, 24주에서의 결과 (LOCF*)

유효성 평가변수	피오글리타존	
	이 약 10 mg N = 140[b]	위약 N = 139[b]
HbA1c (%) 기저치 (평균)	8.37	8.34
기저치 대비 차이[c]	−0.97	−0.42
위약대비 차이(95% CI)	−0.55* (−0.78, 0.31)	–
HbA1c (7%에 도달한 시험대상자의 비율 (%) : 기저치에 대해 보정	36.8**	22.4

a LOCF; Last observation carried forward

b 무작위 배정 및 치료받은 환자 중 1회 이상의 이후 유효성 측정이 있었던 환자

c 기저치에 따라 보정된 최소 제곱 평균 (adjusted LS mean)

*p−value (0.0001

**p−value (0.05

중등증 신장애 3a기 (eGFR 45~60 mL/min/1.73m²) 환자

eGFR이 45~60 mL/min/1.73m² 인 당뇨 환자에 한정한 연구에서, 기존 요법으로 혈당 조절이 충분하지 않은 환자에 다파글리플로진 추가 투여의 유효성을 평가하였습니다. 이 약은 위약 대비 표 12와 같은 HbA1c의 감소를 나타내었습니다.

표 12 eGFR 45~60 mL/min/1.73m² 인 당뇨 환자를 대상으로 이 약의 효과를 확인한 위약 대조 연구에서, 24주에서의 결과

유효성 평가변수	이 약[a] N = 159	위약[a] N = 161
HbA1c (%) 기저치 (평균)	8.35	8.03
기저치 대비 차이[b]	−0.37*	−0.03
위약 대비 차이[b] (95% CI)	−0.34 (−0.53, −0.15)	–

a 기존 요법 중 메트포르민 투여 비율 및 위약군 및 이 약 투여군 각각 64.0% 및 69.4%

b 기저치에 따라 보정된 최소 제곱 평균 (adjusted LS mean)

* p−value (0.001

공복 시 혈당

이 약 10 mg을 단독투여, 또는 메트포르민, 글리메피리드, 메트포르민과 설포닐우레아, 시타글립틴 (단독 또는 메트포르민 병용), 삭사글립틴과 메트포르민 또는 인슐린에 추가 병용 투여하였을 때 위약 대비 통계적으로 유의하게 공복시 혈당을 감소시켰습니다. 이 효과는 투여 첫 주부터 10시수로 연장된 시험 내내 유지되었습니다. eGFR 45~60 mL/min/1.73 m² 인 당뇨 환자를 대상으로 한정한 연구에서 투여 24주 시점 공복 혈당 값은 위약 투여 −0.27 mmol/L (−4.87 mg/dL) 및 다파글리플로진 투여 −1.19 mmol/L (−21.46mg/dL)였습니다.

식후 혈당

이 약 10 mg을 글리메피리드 또는 시타글립틴 (단독 또는 메트포르민 병용)에 추가 병용했을 때 식후 2시간 혈당의 감소가 24주에서 확인되었으며, 48주까지 유지되었습니다.

신혈관계 및 신장에 대한 영향

DECLARE 연구는 다국가, 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 위약 대조 임상시험으로서, 기존 치료 요법에 이 약을 추가하였을 때 신혈관계 및 신장에 대한 위약 대비 다파글리플로진의 영향을 확인하기 위해 수행되었습니다. 모든 환자는 제2형 당뇨병에 추가적으로 최소 2가지 이상의 신혈관계 위험 인자 (만 55세 이상 남성 또는 만 60세 이상 여성, 이상지질혈증, 고혈압 또는 현재 흡연 중 하나 이상)가 있거나 신혈관계 질환이 있었습니다. 17,160명 중 신혈관계 질환이 있었던 환자는 6,974명 (40.6%), 신혈관계 질환이 없었던 환자는 10,186명 (59.4%)이었습니다. 8,582명은 다파글리플로진 10 mg을, 8,578명은 위약을 무작위 배정받았고 추적기간의 중앙값은 4.2년이었습니다.

연구에 참여한 집단의 평균 연령은 63.9세, 이 중 여성은 37.4%였습니다. 전체 환자의 평균 유병 기간은 11.9년이었고 22.4%는 당뇨 유병기간이 5년 이하였습니다. 평균 HbA1c는 8.3%, 평균 체질량지수는 32 kg/m²이었습니다.

베이스라인에서 10.0%의 환자는 심부전의 병력이 있었습니다. 평균 eGFR은 86.2 mL/min/1.73m²로 7.4%의 환자는 eGFR이 60 mL/min/1.73m² 미만이었고, 30.3%의 환자는 미세알부민노증 [노증 알부민 대 크레아티닌 비 (UACR)가 30 mg/g 이상 ~ 300 mg/g 이하] 또는 거대알부민노증 (UACR이 300 mg/g 초과)이 있었습니다.

환자 대부분 (98%)은 베이스라인에서 1종 이상의 당뇨 치료를 받은 약제를 투여 받고 있었습니다. 82%는 메트포르민, 41%는 인슐린, 43%는 설포닐우레아로 치료 중이었습니다.

환자의 약 81.3%는 인지오텐신 전환효소 저해제 또는 인지오텐신차단제, 75.0%는 스타틴, 61.1%는 항혈소판 제, 55.5%는 아스피린, 52.6%는 베타차단제, 34.9%는 칼슘채널차단제, 22.0%는 티아지드계 이뇨제, 10.5%는 루프 이뇨제가 투여되었습니다.

주요 심혈관계 관련 시전

다파글리플로진 10 mg은 심혈관계 질환 사망, 심근경색 또는 허혈성 뇌졸중으로 정의되는 심혈관계 관련 시간 (MACE)의 복합 평가변수에 대한 위약 대비 비열등성을 입증하였습니다(단측 p(0.001).

심부전으로 인한 입원 또는 심혈관계 질환 사망

다파글리플로진 10mg은 일차 복합 평가변수인 심부전으로 인한 입원 또는 심혈관계 질환 사망의 예방에 대해 위약 대비 우월한 효과를 나타냈습니다 (그림 1).

각 요소에 대한 탐색적 분석에서 심부전으로 인한 입원 발생률의 유의한 감소가 치료 효과의 차이에 기여하였으며, 심혈관계 질환 사망에서는 유의한 차이가 없었습니다.

이 약의 위약 대비 치료 우익성은 베이스라인에서의 심혈관계 질환의 유무 및 기저 심부전의 유무와 관계없이 관찰되었고, 연령, 성별, 신기능 (eGFR) 및 지역 등 핵심 하위군 전반에서 일관성을 보였습니다.

그림 1. 심부전으로 인한 입원 또는 심혈관계 질환 사망 사건 첫 발생까지의 기간



환자 수: 구간 별 시작 시점에서 대상 환자 수 (patients at risk)

신장병증

신장과 관련한 평가변수는 탐색적 목적으로 평가되었습니다.

이 약은 확인된 지속적 eGFR 감소, 말기 신질환 신장 또는 신혈관계 사망 등의 복합적인 시간의 발생률을 감소시켰다. 지속적 eGFR 감소, 말기 신질환 및 신장 관련 사망 등 신장 요인의 시간이 감소하면서 치료군 간의 차이가 나타났습니다.

신장병증(지속적 eGFR 감소, 말기 신질환 또는 신장 관련 사망) 사건까지의 시간에 대한 위약대비 다파글리플로진의 위험비(HR)는 0.53 [95% CI 0.43, 0.66]이었습니다.

알부민노증의 병력이 없던 환자에 대해 다파글리플로진은 지속적 알부민노증 (UACR 30 mg/g 초과)으로의 새로운 발병을 위약 대비 감소(위험비(HR) 0.79 [95% CI 0.72, 0.87])시켰고, 개대알부민노증의 병력이 있던 환자에서의 개대알부민노증 감소는 위약군 대비 다파글리플로진군에서 더 크게 나타났습니다 (위험비(HR) 1.82 [95% CI 1.51, 2.20]).

4) 비임상 안전성 자료

① 발암원성: 다파글리플로진은 2년간의 발암성 시험에서 평가된 위면 용량에서도 마우스 또는 랫트에서 종양을 유도하지 않았습니다. 마우스에서의 경구 용량은 수컷에서 5, 15, 40 mg/kg/일, 암컷에서 2, 10, 20 mg/kg/일이었으며, 랫트에서의 경구 용량은 암수 모두 0.5, 2, 10 mg/kg/일 이었습니다. 마우스에서 평가된 최고 용량은 1일 10mg의 최대인체권장용량(MRHD)에서 인체 AUC의 약 72배 (수컷 및 106배인것)의 AUC 노출 배수에 해당하였습니다. 랫트에서의 AUC 노출은 MRHD에서의 인체 AUC의 약 13배(수컷) 및 186배인것)였습니다.

② 돌연변이원성: 다파글리플로진은 Ames 돌연변이성 시험에서 음성이었고, in vitro 염색체 이상 유발성 시험에서는 양성이었으나, 이는 S9 활성 조건에서 100 mg/mL이상 농도일 때 그러하였습니다. 특히, 다파글리플로진은 MRHD에서의 인체 노출의 2100배 이상에 해당하는 노출에서 랫트를 대상으로 실시한 소핵 또는 DNA 복구 시험에서 in vivo 조건의 염색체 이상성에 대해 음성이었습니다. 이 시험들은 랫트 및 마우스 발암성 시험에서 종양 소견이 없다는 점에서, 다파글리플로진이 인체에 대한 유전 독성 위험을 나타내지 않았음을 뒷받침합니다.

③ 생식능장애: 랫트에 대한 생식능 및 초기 배아 발달 시험에서, 15, 75, 또는 300/210 mg/kg/일의 다파글리플로진을 수컷에게 투여하였고(300 mg/kg/일 용량은 4일 후 210 mg/kg/일로 감량), 3, 15, 또는 75 mg/kg/일 용량을 암컷에게 투여하였습니다. 다파글리플로진은 투여한 어떤 용량에서도 수컷 또는 암컷에서 교미, 생식능 또는 초기 배아 발달에 영향을 미치지 않았습니다 (노출 배수는 수컷과 암컷에서 MRHD의 1708 배 이하 및 986 배). 하지만, 300/210 mg/kg/일에서, 정낭 및 부고환 중량이 감소하였고, 정자 운동성 및 정자 수가 감소하였으며, 형태학적으로 비정상인 정자 수는 적었습니다.

④ 최기형성: 이유기의 어린 랫트에 직접 투여하는 것과 임신 후반기 및 수유기시점의 시전발달과 관련하여 임신 2기 및 3기에 해당하는 기간에 간접적으로 약물에 노출되는 것은 후손의 신우확장 및 세뇨관 확장의 심각성 및 사건을 증가시키는 것과 관련이 있습니다. 어린 동물의 독성시험에서 다파글리플로진이 출생 후 21일째 또는 이후 랫트에게 90일째까지 1, 15, 혹은 75 mg/kg/일의 용량으로 투여되었을 때 모든 투여 용량에서 신우확장 및 세뇨관 확장이 보고되었습니다: 가장 낮은 용량에서의 새끼에 대한 노출은 MRHD의 15 배 이상이었습니다. 이러한 관찰 결과는 용량과 관련된 신장 질환의 증가, 또는 용량에서 우이로의 지연 등을 포함한 신장 비대와 관련이 있었습니다. 어린 동물에서 관찰된 신우 확장과 세뇨관 확장은 약 1달간의 회복기간 동안 완전히 역전되지 않았습니다.

⑤ 초기발달장애: 출생전과 출생후의 발달에 대한 별도의 연구에서 모체 랫트는 임신 6일째부터 출산 후 21일 째까지 약물이, 15, 또는 75 mg/kg/일을 투여받았고 새끼는 자궁 속과 수유를 통하여 간접적으로 노출되었습니다. (유즙과 새끼에 대한 다파글리플로진의 영향을 평가하기 위한 별도의 연구가 수행되었습니다.) 75 mg/kg/일의 용량에만 해당 다파글리플로진 노출은 (MRHD에서 인체 수치의 약 145배 및 137배에 해당)에서만이 하나 투여받은 어미의 다 자란 후손에서 신우 확장의 심각성 혹은 사건의 증가됨이 다시 한번 관찰되었습니다. 추가적인 발달 독성은 용량과 관련된 새끼의 체중 감소에 제한되었고 이전 15 mg/kg/일 이상의 용량(새끼의 노출은 [MRHD에서 인체 수치의 29배 이상]에 해당)에서 관찰되었습니다. 모체 독성은 75 mg/kg/일에서만 명백하였으며 투여 초기에 체중의 감소 및 감소와 관련된 일시적 감소와 관련되었습니다. 발달독성에서 무독성용량(NOAEL)인 1 mg/kg/day은 [MRHD에서 인체 수치의 약 9배]에 모체 전신 노출량에 해당합니다. 랫트의 토끼에 대한 추가적인 배태아 발달시험에서 다파글리플로진은 각 종의 기형형성기의 주요한 기간에 해당하는 간격에 투여되었습니다. 토끼에서 투여한 어떤 용량(20, 60 혹은 180 mg/kg/일)에서도 모체 혹은 발달 독성이 관찰되지 않았습니다; 180 mg/kg/일은 MRHD의 약 19배의 전신노출에 해당합니다. 랫트에서 다파글리플로진은 75 mg/kg/일의 용량(MRHD의 약 144배)까지 배아자사성 혹은 최기형성을 나타내지 않았습니다. 150 mg/kg/일의 용량(MRHD에서 인체 수치의 약 234배)에서 모체 및 발달독성이 관련이 있었습니다. 모체 독성은 사망률, 임상 징상 신호 및 체중 및 사료량의 감소를 포함합니다. 발달 독성은 배-태아 치사율, 태아 기형 및 골격 변이 사건의 증가, 태아 체중 감소를 포함합니다. 기형은 대혈관 기형, 늑골과 중상 척추 전멸, 흉골 및 흉골 중심 중복이다. 변이는 주로 골화 감소였습니다.

⑥ 동물 독성학: 랫트와 개에 대한 주요 반복 투여 독성 시험에서 관찰된 대부분의 영향들은 뇨 포도당의 억리학적 제로 배제된 증가에 수반된 것으로 판단되었으며, 체중 감소 및/또는 체중 증가율 감소, 지속 소비량 증가, 삼투성 이뇨제로 인한 뇨량 증가를 포함하였습니다. 다파글리플로진은 랫트에게 25mg/kg/일(MRHD에서의 인체 노출의 346 배 이상)이하의 용량을 최대 6개월간 경구 투여하였을 때 및 개에게 120 mg/kg/일(MRHD에서 인체 노출의 3200 배 이상)이하의 용량으로 최대 9개월간 경구 투여하였을 때 내약성이 양호하였습니다. 또한 다파글리플로진의 단독 투여 시험 결과 랫트와 개의 독성 시험 모두에서, MRHD에서 다파글리플로진의 투여 후 예상되는 인체 dapagliflozin 3-O-glucuronide 노출과 동등하거나 그 이상의 노출 수준(AUC)에서 dapagliflozin 3-O-glucuronide 대사체가 형성되었습니다. 랫트에서 가장 주목할만한 비임상 독성 소견인 해면골 증가 및 직지 무기물화(혈청 감소 증가와 관련)는 높은 노출 배수에서만 관찰되었습니다(MRHD에서 인체 노출에 근거하였을 때 2100배 이상). MRHD에서의 인체 노출 대비 3200배 이상의 노출 배수에도 당뇨연골에도 불구하고, 12개월간의 개에 대한 시험에서 용량 제한 또는 표적 장기 독성은 없었습니다.

5) 의약품동등성시험 정보[8]

시험약 다파프로진정(10밀리그램)(다파글리플로진프로판디올수화물)(주동구바이오제약)과 대조약 포시가정(10밀리그램)(다파글리플로진프로판디올수화물)(한국아스트라제네카)을 2×2 교차시험으로 각 18명씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구 투여하여 31명의 혈중 다파글리플로진을 측정한 결과, 비교평가정옥치(AUC, C_{max})를 로그 변환하여 통계 처리하였을 때, 평균치 차의 90%신뢰구간이 log 0.80에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였습니다.

구분			비교평가정제		참고평가정제	
			AUC_{0-48h} (ng · hr/mL)	C_{max} (ng/mL)	T_{max}(hr)	$t_{1/2}$(hr)
대조약		포시가정(10밀리그램) (다파글리플로진프로판디올수화물) [한국아스트라제네카(주)]	443.2 ± 77.2	186.6 ± 38.9	1.50 (0.50~3.00)	9.15 ± 2.60
시험약		다파프로진정(10밀리그램) (다