

일반의약품

KGMP | 적격업체

조제용

최종개정연월일 2022.04.01

코발맥정

비타민B₁₂
고함량(1500μg)함유

dalim(주)다림바이오텍

[원료약품의분량] 1정 중

- 유효성분

푸르셀티아민(KP).....50 mg

피리독신염산염(KP).....33.33 mg

시아노코발라민(USP).....1.5 mg

폴산(KP).....0.33 mg

· 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)

· 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이노란색(88A620084), 크로스포비돈, 포비돈

[성상] 노란색의 원형 필름코팅정제

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 B₁, B₆의 보급
- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
2. 이 약에 함유된 비타민등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
- 각기
- 눈의 피로

[용법·용량] 만 8세 이상 및 성인: 1일 1회 1정을 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
- 1)이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2)이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
- 1)레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
- 1)의사의 치료를 받고 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
- 1)이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구토, 붉은 변, 설사, 구내염(입안염)
- 2)피리독신을 1일 500 mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 3)폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 4)우발적으로 과량복용 한 경우
- 5)1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없는 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3)오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[포장단위] 90정/병

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)

[최종 개정연월일] 2022.04.01

- ※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 생산된 제품입니다. 구입시 사용기한이 지났거나 유통기한 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 이 첨부문서의 최종개정연월일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해 구제를 신청할 수 있습니다.

dalim(주)다림바이오텍

[제조사] (주)다림바이오텍 강원도 원주시 지정면 신평로 33 A동 1~3층, B동 1층, S동
대표전화: 02) 335-1656 / 소비자상담실: 080) 333-1656(수신자부담)/ 공장 및 연구소: 033) 738-4600
한국의약품안전관리원: 1644-6223, 14-3330