

마르나에프 정

(방풍통성산건조엑스(4.6→1))

Marna F Tab.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중,

- 유효성분: 방풍통성산 건조엑스(4.6→1)(별규) 475mg
- 첨가제(타르색소): 황색5호(알루미늄레이크), 황색203호(알루미늄레이크), 적색40호(알루미늄레이크)
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 콜로이드성아산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 탭설드주황색(790245), 포비돈

【성 상】 주황색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 배에 피하(피부 밑) 지방이 많고 변비기가 있는 환자의 다음 증상: 고혈압의 동반증상 (두근거림, 어깨결림, 흉조, 비만, 부기, 변비)

【용법·용량】 보통 성인 1회 2정을 1일 3회 식전 또는 식간(식사때와 식사때 사이에)에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축작용 또는 골반내 장기의 총괄작용에 의해 유·조산(조기분만)의 위험이 있다.)
- 2) 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황중 안트라퀴논 유도체는 모유중으로 이행되어 영아에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금하거나 수유를 중단한다.)
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하고 있는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

다른 설사약

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 6) 설사, 묽은 변의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 7) 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 묽은 변, 복통, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 8) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 9) 병후의 쇠약기, 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
- 10) 땀이 많이 나는 환자(땀과다, 전신탈력감 등이 나타날 수 있다.)
- 11) 협심증, 심근경색 등의 순환기에 장애가 있는 환자 또는 그 병력이 있는 환자
- 12) 배뇨(소변을 놓)장애 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
- 13) 감작성기능항진증 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
- 14) 지금까지 약에 의한 발진, 발적(총혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 15) 당뇨병 환자(마황(에페드린 류)에 의해 글리코겐의 분해가 촉진되어 혈당이 상승할 우려가 있다.)
- 16) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것
- 17) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 혈장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한 이첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 배합량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쑤임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
 - (2) 근병증(근육병증): 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
 - (3) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등
 - (4) 피부 : 발진, 발적(총혈되어 붉어짐), 가려움 등이 나타나는 경우.
 - (5) 자율신경계 : 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 봄, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등.
 - (6) 비뇨기계 : 배뇨(소변을 놓)장애
 - (7) 간기능 장애 : ST, ALT, ALP, γ -GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애(전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨))가 나타날 수 있으므로 관찰이 충분하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- 2) 1개월 정도(변비에 복용하는 경우 1주일 정도) 복용하여도 증상이 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것
- 2) 자극성 완화제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다.
- 3) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 주의할 것
- 4) 다른 한약제제 등과 병용(함께 복용(사용)) 투여할 경우 함유 생약의 중독에 주의해야 한다. 대황 함유제제와 병용(함께 복용(사용))투여 시 특히 주의할 것
- 5) 마황 또는 에페드린 함유제제, MAO 억제제, 감작성제제(티록신, 리오치오닌), 카테콜아민제제(에피네프린, 이소프레날린), 크산틴계제제(테오필린, 디프로필린)과 병용(함께 복용(사용)) 시 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 봄, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등의 증상이 나타나기 쉬우므로 감량하는 등 신중히 복용할 것.
- 6) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 7) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 300정/병

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

【제조외의 및 판매처】 대화제약㈜, 강원도 횡성군 횡성을 한우로 495

【제조자】 코스맥스파미㈜, 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23

※ 본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(KMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기간이 경과하였거나, 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항이나 작성일자(2022년 04월 21일) 이후 변경된 내용은 [대화제약(주) 홈페이지]나 고객센터전화(080-855-0114)로 문의하시기 바랍니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품 통합정보시스템(<http://medrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 본 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약품안전관리원 (1644-6223) 에 자발적인 부작용 보고 및 피해구제를 문의할 수 있습니다.

첨부문서 작성일 : 2022년 04월 21일