

【성상】 노란색의 원형 필름코팅정

【제조자】 주식회사노바엠헬스케어 경상북도 경산시 하양읍 자석산업4로 16-53

【제조/회자】 경남제약(주) 충청남도 아산시 신항면 서부남로790번길 49

【소비자상담전화】 080-232-8600, www.kyungnampharm.com



일반의약품

10정

1회 2정

유산균이 배합된 정장지사제

설사, 배탈, 복통에는
마가렉스정

설사 / 묽은변 / 체함 / 토사

경남제약(주)

설사, 배탈, 복통에는

마가렉스정

설사 / 묽은변 / 체함 / 토사

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 첨부문서를 확인하세요

【유효성분】 1정(470mg) 중

비스무트차질산염(KP) 100mg, 스코폴리아엑스(KP) 5mg, 아크리
놀수화물(KP) 10mg, 베르베린염화물수화물(KP) 20mg, 락토바실루
스스포르게네스균(발균) 5mg

【효능·효과】 설사, 복통(배앓음)을 수반하는 설사, 체함, 묽은 변, 토사

【용법·용량】

만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2정을 식후에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 신장이나 간 7세 이하의 어린이
3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance),
Lapp 유당분해효소 결핍증(app lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애
(glucose-galactose maldigestion) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 위장진동·진경제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

1) 약으로 알려진 중생발진, 중형되어 붉어짐, 가려움 등을 일으킨 일이 있는 사람
2) 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자, 혈변 환자 또는 잠복변이 계속되는 환자

3) 위·십이지장궤양 등이 있는 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 5) 이 약은
황색4형타르트라진을 함유하고 있으므로 이 성분과 관련하여 알레르기 병력이
있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 사람(경우)이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사,
약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우 2) 이 약을 복용하는 중
안 드물게 입이 마르는 증상이 나타나는 경우 3) 여러 차례 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 장시간 용변·용출을 감지할 것 2) 복용 시에는 음식하지 말 것 3) 이상 기호하여 복용하지 말 것

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 작파(타는)를 피하고 밀수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에
보관하여 보관할 것 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기한】 포장재 측면 표시일까지

【참가제】·티라색소·황색소·참가제(동등유색성분) : 유당수화물(소)의 유당·가타(가)제 : 미
결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 전분(글리콜산나트륨, 크로스카멜로
스나트륨, 밀크, 폴리비닐피롤리돈(PVP), 하이드록시프로필셀룰로오스, 히드록시프로필

※기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 <http://medrug.mfds.go.kr>
→ 「의약품 등 검색」을 참조하시기 바랍니다. ※올바른 사용법을 모르시거나 의문
사항이 있는 경우 의사·약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다. ※만약
구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래
위원회(국) 소비자분쟁해결기준에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습
니다. ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리(1644-6223)