

일양 정로환F에프정

[성상] 흰색~미황색의 원형 필름코팅정

[원료약품 및 그 분량] 1정(271.4mg) 중

유효성분

감초가루(생규)	12.5mg
구아아콜(EP)	25mg
진피건조엑스(5→1)(별규)	8.4mg
황련 가루(생규)	12.5mg
황백엑스산(생규)	40.6mg

첨가제(기타첨가제) : 규산칼슘, 무수인산수소칼슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스카르멜로오스나트륨, 탭실드클리어(19C034), 탭실드흰색(91W1300), 포비돈K-90

[효능·효과]

설사, 체함, 묽은 변, 토사

[용법·용량] 1일 3회 식후에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

만 15세 이상 및 성인	1회 4정
만 11세 이상 ~ 만 15세 미만	1회 3정
만 8세 이상 ~ 만 11세 미만	1회 2정

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

: 만 7세 이하의 어린이

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자(노인), 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자
- 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당시 이 첨부문서를 소지할 것.

: 이 약을 복용하는 동안 드물게 식욕부진, 위부불쾌감 등이 나타나는 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것
- 3) 1주 이상 계속하여 복용하지 말 것

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[포장단위] 36 정/상자(12정/PTPX3)

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[설명서 개정연월일 / 관리번호] 2023.07.07 / P2309-01

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용 기한이 경과되었거나 변질·변태·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품 판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자 분쟁 해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 최종 개정 연월일(2023.07.07) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품 통합정보 시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.


※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223 혹은 14-3330)

[제조회자]



경기도 용인시 기흥구 하갈로 110
소비자상담실: 080-021-1010(수신자요금부담전화)
홈페이지: www.ilyang.co.kr

[제조사]



충남 아산시 신창면 서부남로790번길 60

