

※ 의약품을 사용하시기 전에 주의깊게 읽도록 하시고 설명서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
※ 의약품을 처방된 증상·환자 이외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

나노파모정 10mg (파모티딘)

속쓰림 · 위산과다 · 신트림

일반의약품

원료약품 및 분량

- [유효성분] 1정 중
 - 파모티딘(USP) 10.0mg
- [첨가제]
 - 첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색40호, 황색203호
 - 기타 첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스카멜로오스나트륨, 탈필드녹색(21G025)

성상 : 연녹색의 원형 필름코팅정

효능·효과 : 위산과다, 속쓰림, 신트림

용법·용량 : 16세 이상 1회 1정(10mg), 1일 2정(20mg)까지 복용할 수 있다.

사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약의 성분 및 다른 H2 수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 환자
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 음식을 삼키기 어렵거나 삼킬 때 통증이 있는 경우 및 토혈(혈액구토)이나 혈변이 있는 경우
 - 2) 속쓰림 증상이 3개월 이상 지속된 경우
 - 3) 헛기증(어지러움) 또는 출림, 식은땀이 함께 나타나는 경우
 - 4) 짧은 호흡과 함께 가슴 또는 어깨 통증을 동반하는 경우
 - 5) 가슴통증이 빈번히 나타나는 경우
 - 6) 예상치 않은 체중감소, 오심(구역), 구토, 위장과 통증 등의 증상이 나타나는 경우
 - 7) 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 복용하고는 있는 경우
 - 8) 약물들에 대한 과민증의 병력이 있는 환자
 - 9) 신장에(신장장애) 환자(혈중 농도가 증가될 수 있다)
 - 10) 심질환 환자(심혈관계의 이상반응을 일으킬 수 있다)
 - 11) 간장애 환자(증상이 악화될 수 있다)
 - 12) 교령자(노인)
 - 13) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.)
 - 14) 수유부 (모유 중으로의 이행이 보고되어 있다.)
 - 15) 다음의 약물을 복용하는 경우 : 무졸치로제(이 약의 위산분비 억제작용이 아졸계 항진균(곰팡이)약(예. 이트라코나졸)의 경우 흡수를 저하시킨다.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 증상이 지속되거나 악화되는 경우
 - 2) 이 약은 14일 이상 복용하지 않는다.

3) 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의한다.

- ① 과민증 : 속, 호흡곤란, 전신홍조(온몸이 붉어짐), 안면부종(얼굴부기), 인두부종(부기), 두드러기 등
- ② 혈액 : 백혈구 감소, 적혈구 감소, 혈소판감소(지혈자연과 동일한 의미), 호산구감소, 빈혈, 지혈 지연(전신관태감, 무력, 피하(피부밑)점막하 출혈, 발열)
- ③ 피부 : 피부점막안증후군, 포피괴사증, 발진, 두드러기(홍반)
- ④ 간 : 간기능 이상, AST(GOT) · ALT(GPT) 등의 상승, 총빌리루민 · LDH 상승, 황달, 간염
- ⑤ 근육격계 : 근육통, 황문근용해증(황문근용해), 관절통, 근육경련
- ⑥ 순환기계 : 서맥(느린맥), 빈맥(빠른맥), 가슴 통증, 혈압상승, 안면홍조, 이명(귀울림)
- ⑦ 정신신경계 : 의식장애, 경련, 전신관태감, 두통, 졸음, 불면, 환각, 초조, 흥분, 성욕감퇴, 감각 이상, 두중감(머리무거움), 혼돈, 우울, 어지러움
- ⑧ 소화기계 : 변비, 설사, 구갈, 구역구토, 복부(배부분)팽만감, 식욕부진, 구내염(입안염)
- ⑨ 비호생식계 : 간질성 신염(신장염), 급성 신부전, 발열, 신기능 검사치 이상(BUN · 크레아티닌 상승 등), 월경불순
- ⑩ 호흡기계 : 고열, 기침, 호흡곤란 및 흉부 X-ray 이상을 동반한 간질성 폐렴, 기관지경련
- ⑪ 기타 : 여성형유방, 미각이상

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 이 약의 투여로 위만에 의한 증상이 은폐될 수 있으므로 증상완화 목적으로 일시적으로만 사용한다.
- 2) 알코올이 함유된 음료와 복용하지 않도록 한다.
- 3) 이 약을 투여 후 투약 전과 신체 기능에 변화가 있는 경우 의사 또는 약사와 상담한다.
- 4) 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 결합체를 병용할 경우 탄산칼슘 효능 손실 위험이 발생할 수 있다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 10정/상자(10정/PTP x 1), 20정/상자(10정/PTP x 2), 30정/상자(10정/PTP x 3)

사용기간 : 제조일로부터 36개월

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한(유효기간)이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하십시오.
- ※ 내용 외 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처로 연락하시고, 부작용 보고 및 피해구제 신청은 한국약품안전관리원(1644-6223) 및 피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)에서 할 수 있습니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화 02-2206-3800에서 확인 할 수 있습니다.

소비자 상담전화 : 080-302-3000 (수신자 부담)

제조판매자 : 초당약품공업(주) 경기도 안산시 단원구 별망로 381