

한방생약제

오스틴배농산금탕엑스캡슐

발적 / 부기 / 단단해지고 통증을 수반하는 화농성 질환

일반의약품 | 분류번호 263

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

• 유효성분

지실(KP)-0.5g, 작약(KP)-0.5g, 길경(KP)-0.67g, 건강(KP)-0.17g, 대추(KP)-0.5g, 감초(KP)-0.5g,
 이상 물건조엑스-405mg

• 첨가제(동물유래성분): 젤라틴(소/가죽) • 첨가제(타르색소): 청색1호, 황색4호, 황색5호

• 기타첨가제: 경질무수규산, 캡슐

[성상] 감황색의 분말이 충전된 상, 하부 미황색의 경질캡슐

[효능·효과] 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 단단해지고 통증을 수반하는 화농(끓음)성 질환

[용법·용량] 보통 성인 1회 2캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 발적(충혈되어 붉어짐), 부기, 통증 등의 국소 증상 이외의 두통, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열 등의 전신 증상을
 동시에 수반하는 환자

2) 한성농양(고름집)(寒性膿瘍, 열이 없는 농양(고름집)) 만성종기 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

1) 고혈압 환자 2) 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자 3) 부종(부기) 환자

4) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)

5) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)

6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

7) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자

8) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).))

9) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

10) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기
 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

(1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이
 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감소해서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증,
 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로,
 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)

(2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고
 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.

(3) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등 (4) 소화기계 : 위부불쾌감 등

2) 5-6일 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

3) 이 약의 복용에 의해 드물게 증상이 악화되는 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사,
 약사, 한약사와 상의할 것.

2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는
 티아지드계 이뇨제(트리클로로메타이드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여
 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.

4) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품
 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 [사용기간] 케이스 표시일까지

[포장단위] 10캡슐/상자(10캡슐/피티피)

[제조회자] 오스틴제약(주) 경기도 안산시 단원구 성곡로146번길 20

[제조자] 경방신약(주) 인천광역시 남동구 남동대로 394

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우
 에는 구입하신 약품을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일(2022.03.24)이후 변경된 내용은 홈페이지 <http://new.jeyak.co.kr>이나 소비자 상담실
 (080-010-5510)로 문의 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을
 참조하십시오.

※ 부작용보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)