

출름 싹! 피로 싹!

광동 에너지

일반의약품

J.I.230602-001

【제품명】광동에너지정

【원료약품 및 그 분량】1정 중

- 유효성분: 카페인무수물(KP) 100.0mg, 티아민질산염(KP) 2.5mg, 피리독신염산염(KP) 2.5mg, 시아노코발라민(KP) 3.75μg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이62W28547실버, 오파드라이88A265004브라운, 오파드라이 OY-C-7000A 화이트, 전분글리콜산나트륨, 허드록시프로필셀룰로오스

【성상】은색 필이 있는 열은 갈색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】졸음, 피로회복

【용법·용량】15세 이상 소아 및 성인: 1회 2정을 1일 1 ~ 2 회 복용한다. 복용 간격은 6시간 이상으로 한다. 15세 미만은 복용하지 않는다.

※ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 위산 과다의 증상이 있는 사람.
- 2) 심장병, 위궤양의 진단을 받은 사람.
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

다른 졸음방지약

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 수유부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

피부: 발진
소화기: 식욕 부진, 구역질·구토
정신 신경계: 떨림, 현기증, 불안, 불면증, 두통
순환기: 가슴 두근거림

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속 복용하지 마십시오.
- 2) 카페인 함유 음료(커피, 차 등)와 함께 복용하지 마십시오.
- 3) 정해진 용법 용량을 준수하십시오.
- 4) 6시간 이내의 연속 복용은 피하십시오.
- 5) 씹지 말고, 물 또는 미지근한 물로 복용하십시오. (깨물면 쓴맛이 있습니다)
- 6) 정제가 들어있는 PTP 시트의 뒷부분을 손가락 끝으로 강하게 눌러 안쪽의 알루미늄박을 찢어 꺼내 복용하십시오. (잘못하여 그대로 삼키면 식도 점막을 찢는 등 예기치 못한 사고로 연결될 수 있습니다.)

6. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】20 정/상자((10정/PTP) X2)

※ 본 의약품은 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상해드립니다.

※ 영·유아의 손에 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

※ 본 내용은 최신 정보 및 허가 정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다.

작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 콜로버서비스(080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고: 한국의약품안전관리원(1644-6223/14-3330)

【소비자상담실】080-024-0030(수신자부담 콜로버서비스)

【제조자】광동제약(주) 경기도 평택시 산단로 114

작성일자: 2023.06.02