

이 문서는 이 약을 사용하실 때 필요한 주의사항을 기재한 것으로 이 약과 같이 보관하십시오.

KGMP
우수의약품제조관리제

원광 은교산

일반의약품
분류번호 114

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 (606mg) 중

■ 유효성분 : 금은화 (KP) ... 710 mg 연교 (KP) ... 710 mg
박하 (KP) ... 426 mg 길경 (KP) ... 426 mg
감초 (KP) ... 426 mg 담죽엽 (생규) ... 284 mg
형개 (KP) ... 284 mg 두시 (생규) ... 356 mg
우방자 (KP) ... 356 mg 영양각 (생규) ... 22 mg
(이상 연조엑스로서 490mg)

■ 첨가제 (타르색소) : 캡슐(황색5호, 적색40호, 청색1호, 황색203호)

동물유래성분 : 영양각(가원동물 : 영양, 사용부위 : 뱀),
유당수화물 (가원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

기타첨가제 : 옥수수전분, 스테아르산마그네슘

【성상】 갈색의 분말이 든 상부 갈색, 하부 미황색의 캡슐제

【효능·효과】 감기로 인한 근육통 등증, 목마름, 기침, 두통

【용법·용량】 보통 성인 1회 2캡슐, 7~14세 1캡슐을
1일 3회 식전 또는 식간에 (식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 5세 미만의 영·유아(젖먹이, 갓난아기)
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 몸이 허약한 환자(체력이 쇠약해진 환자, 몸이 약한 환자)
- 5) 위장이 허약한 환자
- 6) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 7) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 9) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
- 10) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
(1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고인, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
(2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
(3) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
(4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역 등
- 2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것.
- 4) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이아이드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 5) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것 (사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온 (1~30℃) 보관

【포장단위】 10캡슐/상자 (10캡슐/PTP), 20캡슐/상자 (10캡슐/PTP×2)

【소비자상담실】 080-359-3333

【제조자】 (주)아이웰드제약 인천광역시 남동구 학박로 316 17B-2L

【제조자의지】 원광제약(주) 전라북도 익산시 춘포면 석암로11길 165

본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견 될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 (080-359-3333) 으로 문의하시거나 또는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인 할 수 있습니다.

부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)

첨부문서 개정 연월일 : 2022.06.30