

육체피로와 신경피로를 한번에!

투비원정 B



일반의약품

KGMP

우수약품지정예

육체피로 | 체력 저하 | 관절, 근육통 | 신경통
눈의 피로 | 피부염 | 구내염 | 아연보급

비타민B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, CoQ10, 아연, 엽산, 셀레늄

[원료약품 및 성분] 1정중

■ 유효성분 :

벤포티아민(KP)(티아민염산염으로서 36.2mg)	50 mg
푸르실티아민(KP)	50 mg
리보플라빈(KP)	100 mg
니코틴산아미드(KP)	100 mg
판토텐산칼슘(KP)	100 mg
피리독신염산염(KP)	100 mg
폴산(KP)	0.5 mg
시아노코발라민 1000배산(KP)(시아노코발라민으로서 0.1 mg)	100 mg
비오틴(USP)	0.5 mg
산화아연(KP)(아연으로서 25.1mg)	31.2 mg
아스코르브산(KP)	100 mg
셀레늄함유간조효모(KP)(셀레늄으로서 17μg)	31.5 mg
유비데카레논(KP)	10 mg

■ 기타첨가제: 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산그네솔, 카올린, 크로스보더, 랩실드갈색(99B917), 랩실드흰색(19W623), 멜크

[성 상] 감색의 정방형 필름코팅정제

[효능 · 효과]

- 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, C의 보급
 - 육체피로 - 임신 · 수유기 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후의 체력 저하)
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절염(요하리통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기 - 눈의 피로
- 아연의 보급

[용법 · 용량] 만 12세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구약, 복용하는 용 티트라사아클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
- 5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자

6) 신장(콩팥)장애 환자

7) 저단백혈증 환자

8) 통풍 환자 또는 신장(콩팥)결석에 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 구내염(입안염), 피부염, 땀 · 호흡기 악취, 탈모, 초근증, 위장관 장애, 소화장애, 상복부(배부위) 통증, 저혈압, 폐부종(부기)
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
- 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고, 당내성(포도당내성)손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 7) 할랄도스테로이드, 트리암테네과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 8) 우발적으로 과량 복용한 경우.
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 각종 요양사시에 할당의 검출을 방해할 수 있다.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 4) 녹차, 초차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선에 피하고 빛을 볼 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
[고객만족팀] 1588-2675

[사용기간] 제조일로부터 36개월
[포장단위] 60정, 120정

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 따라, 정당한 소비자 피해에 대해 보상합니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의약품 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)
- 개정일자 이후 변경된 허가사항: 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

개정일자: 2022.03.22(Rev.01)

[판매원] JW 중의제약

서울특별시 서초구 남부순환로 2477 JW타워

[제조사] Medis 매딕스제약

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170