

고함량 간장 보호

헤파시슬350

(밀크시슬열매건조엑스)

연질
캡슐

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

- 유효성분 : 밀크시슬열매 건조엑스(생규) 350.00 mg
(실리마린으로서 196 mg)
- 기타첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 비결정성소르비톨 액, 산화티탄, 야자경화유, 카라기난, 카카오색소, 콩기름, 폴리스orb에이트80, 황납, 히드록시프로필 옥수수 전분

[성상] 황갈색의 유상내용물을 함유한 암갈색의 장방형연질캡슐

[효능·효과]

다음 질환의 보조치료 : 독성간질환, 만성간염, 간경변

[용법·용량]

1일 1회, 1회 1캡슐

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
- 이 약의 과민증 환자
- 12세 이하의 소아
- 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 임신, 수유부
- 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 드물게 위통 또는 설사
- 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 지킬 것
- 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여

받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것
- 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

[포장단위] 60 캡슐/피티피, 120 캡슐/피티피

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 제조일로부터 24개월

[제조사] 코스맥스파마(주) / 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부

[제조외국] 이연제약(주) / 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 69-10

[판매처] 광동제약(주) / 경기도 평택시 산단로 114

[소비자상담실] 02-569-5662 (반품 및 교환처 : 구입처)

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2022년 04월 13일) 이후 변경된 내용은 www.reyonpharm.co.kr이나 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어설명이나 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 의약품 검색 참조 부탁드립니다.
- ※ 의약품 부작용 피해구제 신청은 한국약품안전관리원(<https://www.drugsafe.or.kr>, 1644-6223, 14-3330)에 하실 수 있습니다.

작성년월일 : 2022.04.13.
19090-00

이연제약주식회사 COSMAX PHARMA