

근육경련 및 혈액순환 개선제

벤포마그빅

액티브에스

연질캡슐



【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

■ 유효성분	
신화마그네슘(KP)	301 mg
(마그네슘으로서 181.50 mg)	
토코페롤아세테이트(KP)	200 mg
(비타민E로서 200IU)	
벤포티아민(KP)	50 mg
(티아민염산염으로서 36.15 mg)	
피리독신염산염(KP)	50 mg
시아노코발라민(KP)	0.5 mg
리보플라빈(KP)	50 mg

- 첨가제(타르색소): 적색40호, 청색호, 황색5호
- 첨가제(동물유래성분): 젤라틴(S, 가죽)
- 첨가제(식물유래성분): 대두유(콩기름)
- 기타첨가제: 농글리세린, 레시틴, 백랍, 산화티탄, 에틸바닐린, 정제수, 판유, 폴리소르베이트80, D-소르비톨액

【성상】 황색의 유상물질(기름상태물질)이 들어있는 적갈색의 장방형 연질캡슐제

【효능·효과】

- 다음 종류의 비타민 E, B1, B2, B6의 보급
 - 육체피로 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화: 어깨·목걸림, 수족 저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절염(요하리통, 어깨걸림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기 · 눈의피로

2. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】 12세 이상 및 성인: 1회 1캡슐, 1일 2회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (2) 만 12개월 미만의 젖먹이 (3) 심한 중증의 신부전 환자 (4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 (5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - (1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 (2) 이 약은 황색 5호(산셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - (1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아; 유아 (3) 심장·순환기계장애 장애 환자 (4) 신장(콩팥)장애 환자 (5) 저단백혈증 환자 (6) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(출혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 묽은 변, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하 (2) 이 약의 투여에 의하여 생리상 예상보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며,

출혈이 오래 지속될 수 있다. (3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다. (4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. (5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B2를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. (6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 유탄혈신부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. (7) 항일소스테론, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. (8) 우발적으로 과량복용 한 경우 (9) 개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 일반적 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당지침을 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제에 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. (2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상감시치에 영향을 줄 수 있다. (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 것은 복용중, 복용전후에는 피할 것.

8. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 시원한 곳에 보관할 것. (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 60캡슐, 120캡슐

【소비자 상담실】 080-811-3011

【판매원】  일양약품

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

【제조(외)지】 메디스제약(주)

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

Medix 메디스제약

【제조자】 동방메프티엘(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 78

 DONGBANG FTL

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다. ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다. ※ 의약품은 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어와야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오. ※ 설명서 개정일자이후 변경된 내용은 식약처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)

개정일자 : 2022.04.20(Rev.01)