

마그원큐

연질
캡슐



[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분 :
 - 산화마그네슘(KP).....251mg
(마그네슘으로서 151.35mg)
 - 토코페롤아세테이트(KP).....500mg
(비타민E로서 500IU)
 - γ-오리자놀(KP).....5mg
 - 피리독신염산염(KP).....50mg
 - 티아민질산염(KP).....50mg

- 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색5호
- 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(소, 가축)
- 첨가제(식물유래성분) : 대두유(콩기름)
- 농글리세린, 레시틴, 백산, 산화티탄, 에틸발닐린, 정제수, 팜유, 폴리소르베이트80, D-소르비톨액

[성상] 미황색의 유상물질(기름상태물질)이 들어있는 적갈색의 장방형 연질 캡슐제

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₆의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요/허리통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기
 - 눈의 피로

2. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법·용량] 만 12세 이상 청소년 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 2회 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 심한 중상의 신부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 2) 이 약은 황색5호(산책열로용 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구약, 복용하는 용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레도도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장(콩팥)장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동 정지), 중추신경계 기능저하
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생기기 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구약은, 복용하는(용) 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자(가)비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)중의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 율혈심부전, 부정맥(가) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 6) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 7) 우발적으로 과량 복용한 경우
- 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 일반적 주의

- 1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 물 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 60캡슐, 120캡슐

[소비자상담실] 080-811-3011

[판매처] 광동생한(주) / 서울시 서초구 서초대로50길 94

[제조(외)지] 메디스제약(주) / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

[제조자] 동방에프티엘(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 78

본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 소손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.

의약품의 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)

설명서 개정일자후 변경된 내용은 식약처의약품통합정보시스템(<https://ndrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

개정일자 : 2022.04.25(Rev.01)