



일반의약품 정보

이 내용은 소비자의 안전한 선택을 위해 허가사항을 요약한 것으로 복용 전 반드시 첨부문서를 확인할 것

※ 부작용 보고 및 피해구제신청: 한국약품안전관리원(1644-6223)

【유효성분】	1캡슐(255 mg) 중
●클로르페니라민말레산염(KP)	3.000 mg
●페닐레프린염산염(JP)	10.000 mg
●벨라돈나총알칼로이드(JP) (총알칼로이드로서 0.133 mg).....	0.133 mg

【효능효과】
●코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화: 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통, 머리 무거움

【첨가제】
●첨가제(천연색소): 심황색소
●첨가제(동물유래성분): 젤라틴(소/돼지, 가축)
●폴리에틸렌글리콜400, 정제수, 프로펠렌글리콜, 포비돈, 부틸히드록시톨루엔, 소르비톨소르비탄액, 농글리세린

【용법용량】
●만 15세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 3회 매 식후에 복용한다.
【성상】 미황색 내지 황색의 투명한 액이 든 황색의 투명한 타원형 연질캡슐
【포장단위】 10캡슐/상자(10캡슐/PTP)
【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관
【사용기간】 제조일로부터 24개월
【제조원】 COSMAX PHARMA® / 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부
【판매원】 GC녹십자 / 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107(보정동)
【소비자상담실】 080-260-0033 (반품 및 교환처 : 구입처)

●본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여드립니다.
●본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
●의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
●설명서 작성일자(2023년 01월 30일)이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

작성일 : 2023년 01월 30일

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이)
 - 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.
다른 비염(코염)용 경구제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해거담제, 멀미약, 알레르기용약 등)
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.
 - 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 3) 고혈압, 심장질환, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 누)곤란, 갑상선질환, 당뇨병 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 4) 고령자(노인)
 - 5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
출혈성뇌졸중, 구역·구토, 목마름(지속적이거나 심한), 변비, 식욕부진, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 배뇨(소변을 누)곤란, 두통, 안면홍조(붉어짐), 비정상적인 눈부심
 - 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
 - ① 속(아나필락시)(과민성쇼크) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 소아에 대한 투여
만2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
 - 3) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
 - 4) 복용시에는 음주하지 말 것.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.