

치지렌정 (디오스민 600mg)

※ 이 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 디오스민(FP) 600mg
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산, 오파드라이EZ클리어(253U190007), 오파드라이분홍색(03B640092), 콜로이드성인산화규소, 탕크

【성상】 분홍 또는 연분홍의 원형 필름코팅정제

【효능·효과】

1. 정맥부전과 관련된 증상의 개선 : 다리 중압감, 통증
2. 모세혈관 취약증에 의한 장애의 보조치료
3. 치질과 관련된 징후의 치료

【용법·용량】

1. 정맥 부전 : 디오스민으로서 1회 600mg 1일 1회 식사 시 복용한다.
2. 치질 : 디오스민으로서 1회 600mg 1일 2 ~ 3회(1,200~1,800mg) 식사 시 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약 성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 수유부
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
임부(필요한 경우에만 이 약 투여가 고려되어야 한다.)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
이 약 투여 후 소화장애가 나타날 수 있으나, 치료를 중단하는 경우는 드물다.
4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
이 약을 투약해도 다른 항문 질환에 대한 특별한 치료법이 면제되지 않는다.
이 약은 오랜 기간 투약하지 말아야 한다.

증상이 빨리 나아지지 않으면, 항문검사를 실시해야 하며 치료를 재검토해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관 (1~30℃)

【사용기한】 외부포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

【포장단위】 30정/피티피 (10 PTP X 3)

【소비자상담】 080-203-6000 (수신자 요금부담)

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL : 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색' 란을 참조하세요.

제조의뢰자 · 판매원 :

코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

제조사 :

풍림무약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120

최초 작성연월일 : 2022.04.25