

징크셀플러스⁺

캡슐

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 기재사항을 확인하세요.

[제품명] 징크셀플러스캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

■ 유효성분

아셀렌산나트륨오수화물(EP) ··· 0.666mg(셀레늄으로서 200μg)

산화아연(KP) ········· 62.244mg(아연으로서 50mg)

토코페롤아세테이트 2배산(KP) ····· 20.00mg(비타민E로서 10IU)

■ 첨가제: 포비돈, 크로스포비돈, 캡슐, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 수크랄로스, 경질무수구산, D-만니톨

[성상] 백색 내지 미백색의 분말이 든 상 · 하부 흰색의 불투명 경질캡슐제

[효능 · 효과]

1. 아연의 보급

2. 다음경우의 비타민 E의 보급: 노년기

[용법 · 용량]

만 12세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

2) 만 12개월 미만의 젖먹이

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사,

치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

3) 소화장애, 만성폐양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자

4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자

5) 신장장애 환자

6) 저단백혈증 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 피부염, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 구토, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 구역, 저혈압, 폐부종
2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
3) 예스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는

혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.

4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

5) 항알도스테론제, 트리암테덴과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

6) 우발적으로 과량복용 한 경우

7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 30캡슐, 60캡슐

[제조사] 경남제약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 49

[판매처] 알엘에스코리아주식회사 경기도 용인시 수지구 풍덕천로 181번길 4-19

[소비자 상담전화] 080-232-8600, www.kyungnampharm.com

※ 기타주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용 시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.

2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 사용을 금하 시기 바랍니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.

※ 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 「소비자분쟁해결기준」에 의거하여 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※ 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 「<https://n.edrug.mfds.go.kr>」 → 「의약품 등 검색」을 참조하시기 바랍니다.

※ 의약품 부작용 발생 시 한국약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다. 부작용 보고 및 피해구제신청: 한국약품안전관리원(1644-6223)

경남제약(주)