

생약성분 목감기약

제일은교산 캡슐

인후통

기침
목마름

두통



제일헬스사이언스

구입시 사용기간이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상 개설지에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입 유통 경로를 통해서 반송하여 주시기 바랍니다. 소비자의 문의는 본사 마케팅부서(사무부: 080-549-0002)에서 상담해 드리고, 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은 책임경영 품질경영부(본전화: 080-332-0002)로 연락바랍니다. 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약품안전관리국(1644-6222) 혹은 의약품 피해구제 전문 상담센터(14-3330)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다. 설명서 작성방법 이후 별첨된 내용을 다시 훑어보십시오(www.jehs.co.kr) 또는 식약처의약품안전시스템(www.jehda.net/mfbs.asp)을 활용하십시오. 성서정 치상열외: 2025.05.10

[제조의료 및 판매원] 제일헬스사이언스(주) 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 78동 [제조원] 경진제약(주) 경기도 이천시 읍면 일생로 406번길 6

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 내용을 확인하세요.

[유효성분] 1캡슐(613밀리그램) 중

■ 유효성분 : 금은화(KP) 710mg, 연교(KP) 710mg, 두시(생규) 356mg, 우방자(KP) 356mg, 박하(KP) 426mg, 길경(KP) 426mg, 감초(KP) 426mg, 담죽엽(생규) 284mg, 형개(KP) 284mg, 영양각(생규) 22mg (동물원료 성분 영양 불) 이상 건조엑스로서 500mg

[호능·호계] 감기로 인한 목구멍 통증, 목마름, 기침, 두통

※용변·용량: 보통 성인 1회 2캔술(2정) 7~14시 1캔술(1정)을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용한다.

(시용상의 주의사항) 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1) 5세 미만의 영장제에 유아 2) 이 약은 유당(乳糖) 함유하고 있으므로 갈락토스 불내성(galactose intolerance), 락타아제 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glycose-galactose malabsorption) 등의 유전적 결함(異常)이 있는 환자에는 투여하여 안된다.

[illegible]

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사 및 약학대학 상담처에 상담할 수 있는 한 약을 처방받은 후 소지할 것. ① 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 ① 위알드스론증: 요양에 감소하거나
얼굴과 손발이 붉고 눈꺼풀이 부어 오르고 손이 굳어지고 혈압이 높아지거나 두통 등의 최대 복용량에 기초하여 10

[illegible]

4. 기타 이익의 배당시 주의할 사항 1) 정해진 합계 용량을 잘 지키고 2) 정기간 계속하여 배당하지 않는 것이 원칙이다. 부득이 정기간 계속하여 배당할 경우에는 회사, 원사, 처제나, 역사, 학사상 의 상행일 등 3) 이연이기에 배당할 경우에는 보지못한 지도 2주 후에 배당 금지 4) 칼출몰유제, 간출몰유제, 군사기전선 등 5) 다른 용출유제, 루트, 이노제(무로네드, 에르리안선 또는 마지드)에 이노제(트루르르에이디드)와 병용(함께 배당)시 위월 2년은종지이다. 처제출몰유제 20 인하여 2년종지(유출증)이 나타나 쉬우므로 신중할 배당할 것 5) 다른 현역제 등 6) 해방 배당금지 7) 해방 유출제 8) 관공제 9) 관공제

5. **저장성의 주의사항** ① 착시광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(습기 후 반드시 밀봉 보관할 것) ② 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 ③ 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용으로 인한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭두어 보관할 것

[저장바구니] 기미요기 신모(1~30주)부과

[사용기하] 용기 츠면 표기일까지

[첨가제] ■ 첨가제(타르세소) · 저산10호 첨산1호 화산5호

■ 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소의 우유)

■ 기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 콜로이드성이산화규소, 캡슐

[성상] 각색의 분말이 충저된 상부 각색 하부 회색의 경질캔속제