

포리버연질캡슐

350밀리그램 (밀크시슬열매건조엑스)

일반의약품 | 분류번호 : 391

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분 : 밀크시슬열매건조엑스(생규).....350mg
- 첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색40호, 황색203호
- 첨가제(동물유래성분) : 속신산젤라틴(소/가죽)
- 기타첨가제 : 경화유, 농글리세린, 레시틴, 백납, 비결정성소르비톨액, 산화티탄, 에틸바닐린, 중쇄트리글리세리드, 카르나우바납, 콩기름

[성상] 황갈색의 유상 내용물을 함유한 녹색의 장방형 연질캡슐

[효능 · 효과] 다음 질환의 보조치료 : 독성간질환, 만성간염, 간경변

[용법 · 용량] 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 임신, 수유부
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 드물게 위통 또는 설사
- 2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 지킬 것.
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기 복용 시에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다.

이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 [사용기간] 케이스 표시일까지

[포장단위] 60캡슐/상자(10캡슐/PTP×6), 120캡슐/상자(10캡슐/PTP×6×2)

[제조외소재] 오스틴제약(주) 경기도 안산시 단원구 성곡로146번길 20

[제조사] (주)서흥 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입 하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일(2022.05.11)이후 변경된 내용은 홈페이지 <http://new.jeyak.co.kr>이나 소비자 상담실 (080-010-5510)로 문의 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)