

유산균이 배합된 정장지사제 락토플플러스 정



✓ 식체

✓ 토사

✓ 설사

✓ 묽은변

10정

【성상】 노란색의 원형 필름코팅정

【제조자】 (주)노바엠헬스케어 경상북도 경산시 하양읍 지산산업4로 5-53

【제조회사】 (주)이든파마 충청북도 진천군 문백면 농다리로 1149

【판매자】 리드팜(주) 서울특별시 서초구 효령로 231, 3층



(주)이든파마

NOVA M W
Healthcare

(주)노바엠헬스케어

일반의약품 정보

이 약을 사용(복용)하기 전 반드시 아래의 기재사항을 확인하십시오.
'부작용 보고' : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

【유효성분】 1정 중

비스무트차질산염(KP) - 100mg, 스코폴리아엑스(KP) - 5mg, 아크리놀
수화물(KP) - 10mg, 베르베린염화물수화물(KP) - 20mg, 락토바실러스
스프로게네스코(변균/활성물질양량: 1.0×10^7 개 이상) - 5mg

【효능·효과】 설사, 복통(배아픔)을 수반하는 설사, 체할, 묽은 변, 토사

【용법·용량】

만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2정을 식후에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 신생아 2) 만 7세 이하의 어린이
3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance),
Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glu-
cose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 위장진동 · 진경(경련완화)제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
2) 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자(노인), 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자 →

3) 위-십이지장염증이 있는 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 5) 이 약은 황색(4
(티르트라진)을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는
신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할
것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우 2) 이 약을 복
용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타나는 경우 3) 여러 차례 투여하여도 증상의
개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 2) 복용 시에는 음주하지 말 것. 3) 3일 이상 계속하여
복용하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가
적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른
용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 케이스 측면 표시일까지(연, 월, 일)

【참가제】

■타르색소: 황색4호 ■동물유래성분: 유당수화물(소, 우유) ■기타 첨가제: 히드록시
프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 크로스카멜로오스나트륨, 전분글리콜산나트
륨, 이산화규소, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 폴리메틸렌글리콜6000, 산화
티탄, 델크