

시타폴엠엑스알 2023. 04. 05
50/500mg, 50/1000mg, 100/1000mg
(시타글립틴염산염수화물/메트포르민염산염)

당뇨병용제

시타폴엠엑스[®]알 50/500mg, 50/1000mg, 100/1000mg

(시타글립틴염산염수화물/메트포르민염산염)

【현역 및 그 분별】 1형 당뇨병	
■ 시타폴엠엑스알 50mg/500mg	
· 유효성분: 시타글립틴염산염수화물(시타글립틴으로서 50mg)..... 56.70mg	
· 메트포르민 염산염..... 500.00mg	
· 첨가제(타르색소): 황색, 청색, 청색, 청색	
· 기타첨가제: 규비제(규광물)클로로소, 유산수산소수합물, 스테아릴마리세나트, 오프드라이 QX 2A4650003 그린, 카르복시메틸셀룰로스, 클로리드(산)인산수, 크로스카셀로스나트륨, 히드록시프로필셀룰로스, 히포로멜로스	
■ 시타폴엠엑스알 50mg/1000mg	
· 유효성분: 시타글립틴염산염수화물(시타글립틴으로서 50mg)..... 56.70mg	
· 메트포르민 염산염(BP)..... 1000.00mg	
· 첨가제(타르색소): 황색, 청색, 청색	
· 기타첨가제: 규비제(규광물)클로로소, 유산수산소수합물, 스테아릴마리세나트, 오프드라이 QX 2A4650003 그린, 카르복시메틸셀룰로스, 클로리드(산)인산수, 크로스카셀로스나트륨, 히드록시프로필셀룰로스, 히포로멜로스	
■ 시타폴엠엑스알 100mg/1000mg	
· 유효성분: 시타글립틴염산염수화물(시타글립틴으로서 100mg)..... 113.40mg	
· 메트포르민 염산염..... 1000.00mg	
· 첨가제(타르색소): 황색, 청색, 청색	
· 기타첨가제: 규비제(규광물)클로로소, 유산수산소수합물, 스테아릴마리세나트, 오프드라이 QX 2A4650003 블루, 카르복시메틸셀룰로스, 클로리드(산)인산수, 크로스카셀로스나트륨, 히드록시프로필셀룰로스, 히포로멜로스	

【성상】	
■ 시타폴엠엑스알 50mg/500mg: ‘별은 파색으로 얻었어’ 불룩한 타원형의 서빙형 필름코팅제	
■ 시타폴엠엑스알 50mg/1000mg: ‘별은 녹색으로 얻었어’ 불룩한 타원형의 서빙형 필름코팅제	
■ 시타폴엠엑스알 100mg/1000mg: ‘별은 파색으로 얻었어’ 불룩한 타원형의 서빙형 필름코팅제	

이 약은 시타글립틴과 메트포르민의 병용투여에 적절한 제형 당뇨병 환자의 혈당조절을 향시키기 위해 시타글립틴을 자동분할로 보조제 투여한다.

[용법·용량]

혈당조절을 위하여 이 약의 용량은 각 성분의 일 최대 권장용량인 시타글립틴 100 mg과 메트포르민 1000 mg을 넘지 않는 범위에서 각 환자의 현재 치료요법, 유산성, 내약성을 고려하여 결정한다. 이 약은 메트포르민을 포함한 용량에 따라 1일 1회 식사와 함께 1일 1회 또는 2회 식사시에 복용하며, 장기간적으로 용량을 조정한다. 서빙형 특성을 유지하기 위해, 이 약은 오직 하루 1회 1회 식사와 함께 1일 1회, 이 약이 불균형하게 용해되어 메트로인 배설물이 감소될 수 있다. 메트로인 배설을 조절하여 용량의 변동이 있지 않아야 해서는 불균형이 없는 약 효과와 이 약이 어떤 다른 약물과 결합되었는지를 신중히 검토할 필요가 있다. 약은 다른 혈액이 조절 할 수 있도록 1일 1회 투여되어야 한다. 서빙형 필름코팅제, 5 일분적 주의 용량 조제. 이 약 100/1000 mg 서빙형 1일 1회, 1일 1회를 복용한다. 이 약 50/500mg 또는 50/1000mg 서빙형 용량은 환자의 1일 1회, 1일 2회를 동시에 복용한다.

1. 1형 메트포르민으로 치료받고 있지 않은 환자

이 약은 당뇨병 약제학을 받은 경험이 없고 단독요법으로 충분한 혈당조절을 이루는 경우 또는 시타글립틴 단독요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 있는 경우 이 약의 치료 용량인 일 총용량으로 시타글립틴 100 mg 및 메트포르민 1000 mg이다. 초기 용량으로 충분한 혈당조절을 할 수 있는 경우, 메트포르민으로 단독 용량을 줄이기 위해 메트로인 배설물을 줄이고 1일 2회 권장용량인 2000 mg까지 용량을 조정할 수 있다. 시타글립틴 용량을 결정하여 이 약에 신장제 환자는 이 약으로 전환해서는 안 된다 (사용상의 주의사항 참조). 다른 약제학에는 투여하지 말 것 참조.

2. 메트포르민으로 치료받고 있는 환자

메트포르민 단독요법으로 충분한 혈당조절을 할 수 있는 환자들에 대해 이 약의 권장 초기 용량은 1일 총용량으로 시타글립틴 100 mg과 메트포르민 500 mg을 복용한다.

시타글립틴과 메트포르민의 병용요법에 이 약으로 전환하는 환자는 시타글립틴과 메트포르민 1회 1회 투여 용량을 시작할 수 있다. 메트포르민을 1회 2회 용량으로 서빙형 1일 1회, 1일 2회 용량으로 시작할 수 있다.

3. 메트포르민과 시타글립틴의 병용요법, 메트포르민과 인슐린의 병용요법, 메트포르민과 치아를 관리하는 시타글립틴을 포함한 병용요법을 할 수 있는 경우

이 약의 초기 용량은 1일 총 용량으로 충분한 혈당조절을 할 수 있는 경우, 메트포르민의 초기 용량은 환자의 혈당과 이 약의 용량에 따라 결정한다. 메트포르민으로 인한 혈당강제 이상반응을 예방하기 위 해서는, 메트로인 배설을 조절하여 용량의 변동이 있지 않아야 해서는 불균형이 없는 약 효과와 이 약이 어떤 다른 약물과 결합되었는지를 신중히 검토할 필요가 있다. 약은 다른 혈액이 조절 할 수 있도록 1일 1회 투여되어야 한다. 서빙형 필름코팅제, 5 일분적 주의 용량 조제. 이 약 100/1000 mg 서빙형 1일 1회, 1일 2회를 복용한다.

이 약은 다른 경우를 혈당강제제로 치료한 환자에게 이 약으로 전환하는 경우의 안전성 및 유산성 검토를 얻는에 실시되었다. 제형 당뇨병 환자에게 이러한 변형도 혈당조절제 변형을 할 수 있도록 1일 1회 투여되어야 하며 적절한 모니터링이 이루어진다.

신장제 환자는 이 약은 종종도 신장에 stage 3a (크리에티닌 청소(CrCl)² ≥ 45 및 < 60 mL/min 또는 사구체 여과율(eGFR)³ ≥ 45 및 < 60 mL/min/1.73m²) 환자 중, 유산성 위험을 증가시킬 수 한 다른 중성 성분들 포함하는 경우 이 약을 500 mg 또는 850 mg 투여하고, 이 약으로 치료를 시작하지 않는다. 메트포르민을 최대 권장용량인 1일 1000 mg으로, 산기능을 5-6개월 동안 유지한다.

신장제 환자는 이 약은 CrCl < 45 mL/min 또는 eGFR < 45 mL/min/1.73m²로 산기능이 감소되는 경우 이 약을 500 mg으로 투여한다.

간장제 환자는 이 약은 메트포르민 성분으로 인해 간기능 장애 환자에게 투여해서는 안된다 (사용상의주의사항 참조). 다른 약제학에는 투여하지 말 것 참조.

[사용상의 주의사항]

- 경고**
시타글립틴
시타글립틴 시판 후 이 약을 투여한 환자에서 중증의 편두통이 보고되었으며, 이 반응은 이 1형 당뇨병, 혈당변동 및 스트레스-종속성으로 표현된 비특이적 증상을 포함한다. 이러한 불특정 다수의 안검증으로부터 재발적으로 보고되었다기 때문에, 발생 빈도 불확실하며 예후 예측하기 어렵고 심각한 영향을 초래하는 것은 알려진 용량에 가능하지 않다. 이 반응의 시판 후 위험은 치료 후 첫 3개월 이내에 발생할 수 있다. 첫 달에 이러한 증상이 발생할 경우 시 구제요법으로 > 60 mL/min/1.73 m²로 산기능이 감소되는 환자나 2도 이상 신장제 이상반응을 경험한 환자, 48시간 이상 이러한 증상을 경험한 환자, 산기능 장애 후 첫 3순 위염이 있는 경우 또는 편두통이 악화되는 치료는 종종도 신장제 환자에게 투여할 수 있다 및 < 60mL/min/1.73 m² 이 약으로 치료받은 경우 투여 후 48시간 전까지 중단되어야 한다. 이러한 이 약에는 재발하기 가능하다. 산기능 장애 후 투여한 환자에서 산기능이 감소되는 경우 이러한 증상을 경험한 후 1과 같다.
메트포르민
유산성 증상은 종종도 제형용을 일으킬 수 있다. 유산성증으로 인한 사망사례가 보고된 바 있다.
제형용
제형용은 제형용을 일으킬 수 있다. 유산성증으로 인한 사망사례가 보고된 바 있다.

- 다른 환자에게 투여하지 것**
1) 당뇨병으로 2도 중증의 신장에 환자(크리에티닌 청소 < 45 mL/min 또는 사구체 여과율 < 45 mL/min/1.73 m²) 및, 산기능 장애, 신장기능 장애(혈액), 급성 신장장애, 폐혈종 또는 신기능이 영향을 줄 수 있는 급성 장애.
2) 중증 및 불완전 혈전성 질환.
3) 산기능이 감소되는 용량에 대한 투여하는 경우에, 정맥요로조절증, 정맥관조절증, 혈관조절증, 정맥을 사용한 혈당강제제 용량을 줄이는 환자(혈당강제제를 일으킬 수 있고, 이 약을 투여하는 용량은 유산성증 유발할 수 있다).
4) 다른 이 약을 투여한 환자(제형용은 시 구제요법으로 > 60 mL/min/1.73 m²로 산기능이 감소되는 환자나 2도 이상 신장제 이상반응을 경험한 환자, 48시간 이상 이러한 증상을 경험한 환자, 산기능 장애 후 첫 3순 위염이 있는 경우 또는 편두통이 악화되는 치료는 종종도 신장제 환자에게 투여할 수 있다 및 < 60mL/min/1.73 m² 이 약으로 치료받은 경우 투여 후 48시간 전까지 중단되어야 한다. 이러한 이 약에는 재발하기 가능하다. 산기능 장애 후 투여한 환자에서 산기능이 감소되는 경우 이러한 증상을 경험한 후 1과 같다.
메트포르민
유산성 증상은 종종도 제형용을 일으킬 수 있다. 유산성증으로 인한 사망사례가 보고된 바 있다.
제형용
제형용은 제형용을 일으킬 수 있다. 유산성증으로 인한 사망사례가 보고된 바 있다.

- 4도 약이 이 약을 투여하는 것에 대한 주의사항**
1) 간고 및 4도 이상반응. 2도 시판 후 이상반응을 포함한다.
2) 유산성증, 혼수, 수화기후나 그로인 일하는 당뇨병제제제제를 포함하는 급성 또는 만성 대사성질환을 일으 킨 케톤산증의 병변이 있는 환자(제형 당뇨병과 당뇨병제제제제제를 일으 킨 병변은 제외한다).
3) 당뇨병제제제제제를 투여한 환자에서 치명적/치명적 특성을 초래는 과다제제제제제를 포함하는 급성 제형용이 있는 경우 (4 이상반응 참조). 이 약 투여 시 약제학 중성이나 다른 신기능이 영향을 줄 수 있는 급성 장애.
4) 간기능 장애 후 첫 3순 위염이 있는 경우 또는 편두통이 악화되는 치료는 종종도 신장제 환자에게 투여할 수 있다 및 < 60mL/min/1.73 m² 이 약으로 치료받은 경우 투여 후 48시간 전까지 중단되어야 한다. 이러한 이 약에는 재발하기 가능하다. 산기능 장애 후 투여한 환자에서 산기능이 감소되는 경우 이러한 증상을 경험한 후 1과 같다.
메트포르민
유산성 증상은 종종도 제형용을 일으킬 수 있다. 유산성증으로 인한 사망사례가 보고된 바 있다.
제형용
제형용은 제형용을 일으킬 수 있다. 유산성증으로 인한 사망사례가 보고된 바 있다.

- 4도 약이 이 약을 투여하는 것에 대한 주의사항**
1) 간고 및 4도 이상반응. 2도 시판 후 이상반응을 포함한다.
2) 유산성증, 혼수, 수화기후나 그로인 일하는 당뇨병제제제제를 포함하는 급성 또는 만성 대사성질환을 일으 킨 케톤산증의 병변이 있는 환자(제형 당뇨병과 당뇨병제제제제제를 일으 킨 병변은 제외한다).
3) 당뇨병제제제제제를 투여한 환자에서 치명적/치명적 특성을 초래는 과다제제제제제를 포함하는 급성 제형용이 있는 경우 (4 이상반응 참조). 이 약 투여 시 약제학 중성이나 다른 신기능이 영향을 줄 수 있는 급성 장애.
4) 간기능 장애 후 첫 3순 위염이 있는 경우 또는 편두통이 악화되는 치료는 종종도 신장제 환자에게 투여할 수 있다 및 < 60mL/min/1.73 m² 이 약으로 치료받은 경우 투여 후 48시간 전까지 중단되어야 한다. 이러한 이 약에는 재발하기 가능하다. 산기능 장애 후 투여한 환자에서 산기능이 감소되는 경우 이러한 증상을 경험한 후 1과 같다.
메트포르민
유산성 증상은 종종도 제형용을 일으킬 수 있다. 유산성증으로 인한 사망사례가 보고된 바 있다.
제형용
제형용은 제형용을 일으킬 수 있다. 유산성증으로 인한 사망사례가 보고된 바 있다.

- 4도 약이 이 약을 투여하는 것에 대한 주의사항**
1) 간고 및 4도 이상반응. 2도 시판 후 이상반응을 포함한다.
2) 유산성증, 혼수, 수화기후나 그로인 일하는 당뇨병제제제제를 포함하는 급성 또는 만성 대사성질환을 일으 킨 케톤산증의 병변이 있는 환자(제형 당뇨병과 당뇨병제제제제제를 일으 킨 병변은 제외한다).
3) 당뇨병제제제제제를 투여한 환자에서 치명적/치명적 특성을 초래는 과다제제제제제를 포함하는 급성 제형용이 있는 경우 (4 이상반응 참조). 이 약 투여 시 약제학 중성이나 다른 신기능이 영향을 줄 수 있는 급성 장애.
4) 간기능 장애 후 첫 3순 위염이 있는 경우 또는 편두통이 악화되는 치료는 종종도 신장제 환자에게 투여할 수 있다 및 < 60mL/min/1.73 m² 이 약으로 치료받은 경우 투여 후 48시간 전까지 중단되어야 한다. 이러한 이 약에는 재발하기 가능하다. 산기능 장애 후 투여한 환자에서 산기능이 감소되는 경우 이러한 증상을 경험한 후 1과 같다.
메트포르민
유산성 증상은 종종도 제형용을 일으킬 수 있다. 유산성증으로 인한 사망사례가 보고된 바 있다.
제형용
제형용은 제형용을 일으킬 수 있다. 유산성증으로 인한 사망사례가 보고된 바 있다.

- 4도 약이 이 약을 투여하는 것에 대한 주의사항**
1) 간고 및 4도 이상반응. 2도 시판 후 이상반응을 포함한다.
2) 유산성증, 혼수, 수화기후나 그로인 일하는 당뇨병제제제제를 포함하는 급성 또는 만성 대사성질환을 일으 킨 케톤산증의 병변이 있는 환자(제형 당뇨병과 당뇨병제제제제제를 일으 킨 병변은 제외한다).
3) 당뇨병제제제제제를 투여한 환자에서 치명적/치명적 특성을 초래는 과다제제제제제를 포함하는 급성 제형용이 있는 경우 (4 이상반응 참조). 이 약 투여 시 약제학 중성이나 다른 신기능이 영향을 줄 수 있는 급성 장애.
4) 간기능 장애 후 첫 3순 위염이 있는 경우 또는 편두통이 악화되는 치료는 종종도 신장제 환자에게 투여할 수 있다 및 < 60mL/min/1.73 m² 이 약으로 치료받은 경우 투여 후 48시간 전까지 중단되어야 한다. 이러한 이 약에는 재발하기 가능하다. 산기능 장애 후 투여한 환자에서 산기능이 감소되는 경우 이러한 증상을 경험한 후 1과 같다.
메트포르민
유산성 증상은 종종도 제형용을 일으킬 수 있다. 유산성증으로 인한 사망사례가 보고된 바 있다.
제형용
제형용은 제형용을 일으킬 수 있다. 유산성증으로 인한 사망사례가 보고된 바 있다.

환자수 (%)	
1형 당뇨병	
2형 당뇨병	
3형 당뇨병	
4형 당뇨병	
5형 당뇨병	
6형 당뇨병	
7형 당뇨병	
8형 당뇨병	
9형 당뇨병	
10형 당뇨병	
11형 당뇨병	
12형 당뇨병	
13형 당뇨병	
14형 당뇨병	
15형 당뇨병	
16형 당뇨병	
17형 당뇨병	
18형 당뇨병	
19형 당뇨병	
20형 당뇨병	
21형 당뇨병	
22형 당뇨병	
23형 당뇨병	
24형 당뇨병	
25형 당뇨병	
26형 당뇨병	
27형 당뇨병	
28형 당뇨병	
29형 당뇨병	
30형 당뇨병	
31형 당뇨병	
32형 당뇨병	
33형 당뇨병	
34형 당뇨병	
35형 당뇨병	
36형 당뇨병	
37형 당뇨병	
38형 당뇨병	
39형 당뇨병	
40형 당뇨병	
41형 당뇨병	
42형 당뇨병	
43형 당뇨병	
44형 당뇨병	
45형 당뇨병	
46형 당뇨병	
47형 당뇨병	
48형 당뇨병	
49형 당뇨병	
50형 당뇨병	
51형 당뇨병	
52형 당뇨병	
53형 당뇨병	
54형 당뇨병	
55형 당뇨병	
56형 당뇨병	
57형 당뇨병	
58형 당뇨병	
59형 당뇨병	
60형 당뇨병	
61형 당뇨병	
62형 당뇨병	
63형 당뇨병	
64형 당뇨병	
65형 당뇨병	
66형 당뇨병	
67형 당뇨병	
68형 당뇨병	
69형 당뇨병	
70형 당뇨병	
71형 당뇨병	
72형 당뇨병	
73형 당뇨병	
74형 당뇨병	
75형 당뇨병	
76형 당뇨병	
77형 당뇨병	
78형 당뇨병	
79형 당뇨병	
80형 당뇨병	
81형 당뇨병	
82형 당뇨병	
83형 당뇨병	
84형 당뇨병	
85형 당뇨병	
86형 당뇨병	
87형 당뇨병	
88형 당뇨병	
89형 당뇨병	
90형 당뇨병	
91형 당뇨병	
92형 당뇨병	
93형 당뇨병	
94형 당뇨병	
95형 당뇨병	
96형 당뇨병	
97형 당뇨병	
98형 당뇨병	
99형 당뇨병	
100형 당뇨병	
101형 당뇨병	
102형 당뇨병	
103형 당뇨병	
104형 당뇨병	
105형 당뇨병	
106형 당뇨병	
107형 당뇨병	
108형 당뇨병	
109형 당뇨병	
110형 당뇨병	
111형 당뇨병	
112형 당뇨병	
113형 당뇨병	
114형 당뇨병	
115형 당뇨병	
116형 당뇨병	
117형 당뇨병	
118형 당뇨병	
119형 당뇨병	
120형 당뇨병	
121형 당뇨병	
122형 당뇨병	
123형 당뇨병	
124형 당뇨병	
125형 당뇨병	
126형 당뇨병	
127형 당뇨병	
128형 당뇨병	
129형 당뇨병	
130형 당뇨병	
131형 당뇨병	
132형 당뇨병	
133형 당뇨병	
134형 당뇨병	
135형 당뇨병	
136형 당뇨병	
137형 당뇨병	
138형 당뇨병	
139형 당뇨병	
140형 당뇨병	
141형 당뇨병	
142형 당뇨병	
143형 당뇨병	
144형 당뇨병	
145형 당뇨병	
146형 당뇨병	
147형 당뇨병	
148형 당뇨병	
149형 당뇨병	
150형 당뇨병	
151형 당뇨병	
152형 당뇨병	
153형 당뇨병	
154형 당뇨병	
155형 당뇨병	
156형 당뇨병	
157형 당뇨병	
158형 당뇨병	
159형 당뇨병	
160형 당뇨병	
161형 당뇨병	
162형 당뇨병	
163형 당뇨병	
164형 당뇨병	
165형 당뇨병	
166형 당뇨병	
167형 당뇨병	
168형 당뇨병	
169형 당뇨병	
170형 당뇨병	
171형 당뇨병	
172형 당뇨병	
173형 당뇨병	
174형 당뇨병	
175형 당뇨병	
176형 당뇨병	
177형 당뇨병	
178형 당뇨병	
179형 당뇨병	
180형 당뇨병	
181형 당뇨병	
182형 당뇨병	
183형 당뇨병	
184형 당뇨병	
185형 당뇨병	
186형 당뇨병	
187형 당뇨병	
188형 당뇨병	
189형 당뇨병	
190형 당뇨병	
191형 당뇨병	
192형 당뇨병	
193형 당뇨병	
194형 당뇨병	
195형 당뇨병	
196형 당뇨병	
197형 당뇨병	
198형 당뇨병	
199형 당뇨병	
200형 당뇨병	
201형 당뇨병	
202형 당뇨병	
203형 당뇨병	
204형 당뇨병	
205형 당뇨병	
206형 당뇨병	
207형 당뇨병	
208형 당뇨병	
209형 당뇨병	
210형 당뇨병	
211형 당뇨병	
212형 당뇨병	
213형 당뇨병	
214형 당뇨병	
215형 당뇨병	
216형 당뇨병	
217형 당뇨병	
218형 당뇨병	
219형 당뇨병	
220형 당뇨병	
221형 당뇨병	
222형 당뇨병	
223형 당뇨병	
224형 당뇨병	
225형 당뇨병	
226형 당뇨병	
227형 당뇨병	
228형 당뇨병	
229형 당뇨병	
230형 당뇨병	
231형 당뇨병	
232형 당뇨병	
233형 당뇨병	
234형 당뇨병	
235형 당뇨병	
236형 당뇨병	
237형 당뇨병	
238형 당뇨병	
239형 당뇨병	
240형 당뇨병	
241형 당뇨병	
242형 당뇨병	
243형 당뇨병	
244형 당뇨병	
245형 당뇨병	
246형 당뇨병	
247형 당뇨병	
248형 당뇨병	
249형 당뇨병	
250형 당뇨병	
251형 당뇨병	
252형 당뇨병	
253형 당뇨병	
254형 당뇨병	
255형 당뇨병	
256형 당뇨병	
257형 당뇨병	
258형 당뇨병	
259형 당뇨병	
260형 당뇨병	
261형 당뇨병	
262형 당뇨병	
263형 당뇨병	
264형 당뇨병	
265형 당뇨병	
266형 당뇨병	
267형 당뇨병	
268형 당뇨병	
269형 당뇨병	
270형 당뇨병	
271형 당뇨병	
272형 당뇨병	
273형 당뇨병	
274형 당뇨병	
275형 당뇨병	
276형 당뇨병	
277형 당뇨병	
278형 당뇨병	
279형 당뇨병	
280형 당뇨병	
281형 당뇨병	
282형 당뇨병	
283형 당뇨병	
284형 당뇨병	
285형 당뇨병	
286형 당뇨병	
287형 당뇨병	
288형 당뇨병	
289형 당뇨병	
290형 당뇨병	
291형 당뇨병	
292형 당뇨병	
293형 당뇨병	
294형 당뇨병	
295형 당뇨병	
296형 당뇨병	
297형 당뇨병	
298형 당뇨병	
299형 당뇨병	
300형 당뇨병	
301형 당뇨병	
302형 당뇨병	
303형 당뇨병	
304형 당뇨병	
305형 당뇨병	
306형 당뇨병	
307형 당뇨병	
308형 당뇨병	
309형 당뇨병	
310형 당뇨병	
311형 당뇨병	
312형 당뇨병	
313형 당뇨병	
314형 당뇨병	
315형 당뇨병	
316형 당뇨병	
317형 당뇨병	
318형 당뇨병	
319형 당뇨병	
320형 당뇨병	
321형 당뇨병	
322형 당뇨병	
323형 당뇨병	
324형 당뇨병	
325형 당뇨병	
326형 당뇨병	
327형 당뇨병	
328형 당뇨병	
329형 당뇨병	
330형 당뇨병	
331형 당뇨병	