

※ 의약품 사용하시기 전에 주의깊게 읽도록 하시고 설명서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
※ 의약품을 처방된 증상·환자 외에는 사용하지 말고, 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

생약성분 함유한 간장질환개선헌

내간애 플러스

연질캡슐

밀크시슬열매건조엑스350mg

KGMP적격업체 일반의약품

간장해독
간장보호
간세포 손상예방

원료약품 및 분량

[유효성분] 1캡슐(1,170mg) 중

■ 밀크시슬열매건조엑스(생규) 350 mg

(실리마린으로서 196 mg)

[첨가제]

■ 착색제(천연색소) : 카카오색소

■ 기타첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 비결정성소르비톨액, 산화티탄, 아자경화유, 카라기난, 콩기름, 폴리소르베이트80, 황납, 히드록시프로필 옥수수전분

성상 : 황갈색의 유상내용물을 함유한 암갈색의 장방형연질캡슐

효능·효과 : 다음 질환의 보조치료: 독성간질환, 만성간염, 간경변

용법·용량 : 1일 1회, 1회 1캡슐

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
- 2) 이 약의 과민증 환자
- 3) 12세 이하의 소아
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 임신, 수유부
- 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 드물게 위통 또는 설사
- 2) 알레르기 반응

4. 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것
- 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지 질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

저장 방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장 단위 : 60캡슐/PTP, 120캡슐/PTP, 60캡슐/병, 120캡슐/병, 120캡슐/상자(2캡슐/포일*60)

사용 기간 : 제조일로부터 24개월

소비자 상담 전화 : 080-302-3000(수신자 부담)

제 조 자 : 코스맥스파마(주) / 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부

제조의뢰 및 판매자 : 초당약품공업(주) / 경기도 안산시 단원구 별망로 381

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한(유효기한)이 경과되었거나 변질·변패 또는
오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)
을 참조하세요.

※ 내용 외 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처로 연락하시고, 부작용 보고 및 피해구제신청은
한국의약품안전관리원(1644-6223) 및 피해구제 제도 전용 상담번호(14-3330)에서 할 수 있습니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 www.chodang.com 또는 전화 02-2206-3800에서 확인할 수 있습니다