

국내최초 고효량 콘드로이친 800 mg ! 활성형 신경비타민 B12 메코발라민 1,000 µg 함유 투엑스비 콘드로800



【원료약품 및 분량】1정 중

• 유효성분	
콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	800 mg
벤조티아민(티아민염산염으로 36.15 mg) (KP)	50 mg
니코틴아미드(KP)	30 mg
피리독신염산염(KP)	50 mg
판토탄산칼슘(KP)	15 mg
리보플라빈(KP)	6 mg
노숙클레칼시페롤 산(비타민D로서 1000IU) (EP)	10 mg
메코발라민(KP)	1 mg
이노시톨(KP)	20 mg
클린타르타르산염(USP)	20 mg
시트르산칼슘(칼슘으로서 12.64 mg) (USP)	60 mg
신화아연(아연으로서 4 mg) (KP)	5 mg
산화마그네슘(마그네슘으로서 18.1 mg) (KP)	30 mg

- 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 크로스보비돈, 전분글리콜산나트륨, 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 탈실드칼슘(99B703)
- 동물유래성분 : 콘드로이틴설페이트나트륨(기원:소, 사용부위:연골)

【성상】적갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 D, B1, B6, B12의 보급
 - 1) 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후의 체력저하시, 발육기, 노년기
 - 2) 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과에는 다음과 같습니다.
 - 뼈, 이의 발육발달, 구루병의 예방, 각기, 눈의 피로
2. 다음 증상의 완화
 - 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】 만 19세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - ① 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염종질환), 신장질환 환자
 - ② 이 약 및 이 약에 포함된 성분은 과민반응이 있는 환자
 - ③ 만 12개월 미만의 젖먹이
 - ④ 신장결석 환자
 - ⑤ 심한 증상의 심부전 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 4) 일부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 감시배당체를 투여 중인 환자
- 9) 신장결석 병력이 있는 환자
- 10) 임부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 설사, 붉은 변, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전 수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 폐부종
- 2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 4) 고통량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 6) 정기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜하십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 제조일로부터 36 개월

【포장단위】 30정/병, 45정/병, 60정/상자(30정/병×2), 90정 상자(45정/병×2)

【소비자상담실】 080-549-0002 / www.jeilhs.co.kr

【판매처】 제일헬스사이언스(주) / 서울특별시 서초구 사평대로 343

【제조처】 성이바이오(주) / 강원도 원주시 지정면 지래로 184 1층 일부, 3층

※ 의약품을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관 하시기 바랍니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하시기 바랍니다.

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염 및 손상된 제품은 구입처에서 교환하여 드립니다.

※ 의약품 용어설명, 의약품 허가 변경사항 등 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품 안전나라(<http://nedrug.mfds.go.kr/>)의 의약품 정보를 참조하시기 바랍니다.

※ 의약품 부작용 피해구제신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)