

육체피로, 체력저하, 눈의피로, 신경통,
근육통, 관절통, 아연의 보급, 뼈,
이의 발육불량, 구내염, 설염, 피부염



고함량 활성형 비타민
비파인정

[원료약품 및 그 분량] 1정(1,255mg) 중

■ 유효성분

벤포티아민[티아민염산염으로서 68.7mg(KP)]	95mg	시아노코발라민(KP)	0.5mg
비스벤티아민[티아민염산염으로서 2.2mg(KP)]	5mg	콜레칼시페롤농축분말[비타민D로서 10000IU(유)(EP)]	10mg
리보플라빈(KP)	100mg	셀레늄함유건조효모(셀레늄으로서 21.6μg(KP))	40mg
니코틴산아미드(KP)	10mg	산화아연(아연으로서 24mg)(KP)	30mg
판토텐산칼슘(KP)	100mg	산화마그네슘(마그네슘으로서 60mg)(KP)	100mg
피리독신염산염(KP)	100mg	우르스테옥시콜산(KP)	30mg
비오틴(USP)	0.1mg	콜린타르타르산염(USP)	100mg
폴산(KP)	0.4mg	이노시톨(KP)	100mg

■ 기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스포비돈, 탬플드갈색(29B1093)

[성상]

갈색의 정방형 필름코팅정제

[용법 · 용량]

만 12세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 식후 복용

[효능 · 효과]

○ 다음 경우의 비타민 D, B₁, B₂, B₆의 보급

- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 발육기
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방 · 각기 · 눈의 피로
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

○ 아연의 보급

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (4) 신장(콩팥)결석 환자
- (5) 심한 증상의 신부전 환자
- (6) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- (7) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구먹는, 복용하는)용 티트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다

- (3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- (4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- (5) 신장(콩팥)장애 환자
- (6) 저단백혈증 환자
- (7) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- (8) 임부
- (9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 혈액염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- (10) 만 1세 미만의 젖먹이
- (11) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 붉은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀 · 호흡시 약취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종(부기)
- 2) 피라독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- 4) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도,감독하에 투여할 것

6. 일반적 주의

- 1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다.
환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 뭄 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[사용기간]

제조일로부터 36개월

[포장단위]

120정(60정/병x2)

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

- 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자 분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상에 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 첨부문서 최종 개정연월일(2022.08.19)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인 할 수 있습니다.
- 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.
- 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국약품안전관리원(14-3330 혹은 1644-6223)

[판매처]



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110
소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)
학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

[제조자]



메딕스제약

전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170