

위아제 정

판크레아틴 175mg
셀룰라제 50mg
우담즙건조엑스 25mg
시메티콘 26mg

일반의약품
조제용

환인제약(주)

500정

【원료약품의 분량】 1정 중

- 유효성분 : 판크레아틴(KP) 175.00mg(전분당화력 1654 단위 이상, 지방소화력 677 단위 이상, 단백소화력 22365 단위 이상), 셀룰라제(KP) 50.00mg(섬유소당화력 60 단위 이상), 우담즙 건조엑스(생규) 25.00mg(콜산(으)로서 11.25mg), 시메티콘(KP) 26.00mg
- 첨가제(동물유래) : 유당(젖당)수화물(소, 우유)
- 첨가제(타르색소) : 청색 1호(브릴리안트블루 FCF) 알루미늄레이크, 황색 203호(퀴놀린옐로우 WS) 알루미늄레이크
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 전분글리콜 산나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 탭실드 녹색 319G726, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 연녹색의 타원형 장용성 필름코팅정

【효능·효과】 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】 만 15세 이상 : 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용합니다.

【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 1) 만 7세 이하의 어린이 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다. 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오. 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우 4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오. 5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오. 3) 오용(잘못사용)을

막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 500정

【제품문의처】 고객센터전화(080-405-1238)

【제조회사의자】 환인제약(주) / 경기도 안성시 공단로 50

【제조자】 (주)노바엠헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

※ 약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 제품 개봉 또는 취급 시에 포장(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

※ 본 제품은 GMP규정에 따라 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 사용기한의 경과, 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품 부작용 신고·피해구제 상담 : 1644-6223, 피해구제 상담 전용 : 14-3330

※ 본 의약품 허가사항 및 외부포장 개정일자(2022.05.31) 이후 변경된 내용은 www.whanin.com이나 고객센터전화(080-405-1238)에서 확인하실 수 있습니다. WEAL500-0

【제조번호】

【사용기한】

35X18mm

