

생리통에 효과빠른 액상형 진통제

유한 이브펜

연질 캡슐

일반의약품

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

- 유효성분
이부프로펜(BP) ----- 200mg
파마브롬(USP) ----- 25mg
메타규산알루미늄마그네슘(KP) ----- 100mg
- 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(기원동물: 소, 사용 부위: 가죽)
- 기타첨가제: 폴리메틸렌글리콜600, 정제수, 수산화칼륨, 폴리소르베이트80, 소르비톨스페셜글리세린비렌드, 락토스, 산화티탄

[성상] 흰색 또는 분홍색의 내용물을 함유한 적색의 타원형 연질캡슐

YH eve

[효능·효과]

1. 두통, 치통, 발치후 통증(통증), 인후(목구멍)통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요(허리)통, 근육통, 건통(어깨결림), 타박통, 골절통, 염좌통(뺨통증), 월경통(생리통), 외상통의 진통
2. 오한(출고 열리는 증상), 발열시의 해열

[용법·용량]

- 만 15세 이상 및 성인: 1일 1~3회, 1회 1~2캡슐
- 만 8세 이상 ~ 만 15세 미만: 1일 1~3회, 1회 1캡슐
- 공복(빈속)시를 피하여 복용합니다.
- 복용간격은 4시간 이상으로 합니다.
- * 유한이브펜연질캡슐은 어린이 약물사고를 방지하기 위한 '어린이 보호용 안전용기 포장'이므로, PTP포장 앞면을 강한 힘으로 눌러야만 개봉 가능합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

- 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있습니다.
- 2) 심혈관계 위험 조절되지 않는 고혈압, 율혈심부전증(NYHA II~III), 확립된 허혈성 심장질환, 말초동맥질환, 뇌혈관질환을 가진 환자들은 신중히 고려하여 이부프로펜을 사용해야 하며 고용량 이부프로펜(1일 2,400mg) 사용을 피해야 합니다. 또한 심혈관계 위험 요소(예, 고혈압, 고지혈증, 당뇨병, 흡연)를 가지고 있는 환자가 고용량 이부프로펜(1일 2,400mg)이 필요한 경우 장기간 치료를 시작하기 전에 신중히 고려해야 합니다.
- 임상연구 결과 고용량(1일 2,400mg) 이부프로펜 사용이 동맥 혈전 증상(심근경색증 또는 뇌졸중)에 대한 위험성을 다소 증가시킬 수 있다고 나타났습니다. 종합적으로 역학연구 결과 저용량 이부프로펜(예, 1일 1,200 mg 이하)과 동맥 혈전 증상의 위험성 증가간의 연관성은 증명되지 않았습니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

다른 해열진통제, 감기약, 진정제

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의하십시오.)
- 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 고령자(노인)
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 8) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 9) 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이뇨제를 복용하는 사람
- 10) 심근경색이나 뇌졸중 예방목적으로 저용량 아스피린을 복용하는 사람 (이 약은 아스피린의 효과를 감소시키고, 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험을 증가시킬 수 있습니다.)

실험실적 자료에서 이부프로펜과 아스피린(아세틸살리실산) 병용투여시 이부프로펜이 저용량 아스피린의 혈소판 응집 효과를 억제할 수 있다고 나타났습니다. 이 데이터 외삽법에 대해 임상적으로 불확실성이 존재하지만 일반적 또는 장기간 이부프로펜 사용시, 저용량 아스피린의 심장 보호 효과가 감소될 수 있습니다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(출혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화관출혈, 위부불쾌감, 어지러움, 부종(부기)
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
① 아나필락시스(과민성쇼크): 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
② 피부점막안(눈)증후군(스티븐스-존슨증후군), 중증표피괴사사용예(리델증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적(출혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 경막에 나타날 수 있습니다.
③ 천식
- 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 4) 광민감 반응(빈도불명), 빈도불명의 호산구 증가 및 전신 증후군을 동반한 약물 발진(DRESS 증후군)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 이 약의 과량 복용 시 대사산증이 나타날 수 있습니다.

6. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받습니다.

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 경해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 장기간 계속 복용하지 마십시오.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시키십시오.
- 4) 복용시에는 음주하지 마십시오.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

* 연질캡슐이 녹거나 변형 및 변색될 수 있으므로 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 보관하십시오.

[사용기한] 외부포장에 표기

* бли스터 포장의 제조번호/사용기한 표시방법은 아래와 같습니다.

예) 제조번호: #22001, 사용기한 2024년 1월 7일인 경우 → "22001/2024.01.07"로 표시

[포장단위] 10캡슐

* 이 제품은 정부의 '소비자분쟁해결기준'에 의거 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

* 이 첨부문서의 작성연월일 이후 변경내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

* 이 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

첨부문서 작성연월일: 2022년 10월 28일

제조·회·판매자



유한양행

본사: 서울시 동작구 노량진로 74

공장: 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지 219

홈페이지: www.yuhan.co.kr

소비자상담실: 080-024-1188(수신자 요금부담)

제조자: **현알피바이오** / 경기도 화성시 함남읍 제약공단4길 35-7