

CCB계 고혈압 치료제

아젤핀 정

(아젤니디핀)

Azelpine Tab.

분류번호: 214



저희 메디카코리아는 인간중심의 기업, 함께 나눌 줄 아는 기업이란 경영이념을 바탕으로 인류의 건강과 아름다운 삶을 위해 우수한 품질의 제품을 공급해드리고자 노력하고 있습니다. 저희가 생산하는 의약품 하나하나에는 생명의 존엄성을 가장 귀한 가치로 여기는 메디카코리아 임직원들의 정성이 깃들여 있습니다.

【성분·함량】 1정 중

- 아젤핀정8밀리그램
- 유효성분: 아젤니디핀(JP).....8mg
- 기타 첨가제: D-만니톨, 메글루민, 메타규산알루미늄산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도하이드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 클로이드르성아산화규소, 폴리소르베이트80, 히드록시프로필셀룰로오스
- 아젤핀정16밀리그램
- 유효성분: 아젤니디핀(JP).....16mg
- 기타 첨가제: D-만니톨, 메글루민, 메타규산알루미늄산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저치환도하이드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 클로이드르성아산화규소, 폴리소르베이트80, 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】

- 아젤핀정8밀리그램: 노란색의 원형 정제
- 아젤핀정16밀리그램: 노란색의 원형 정제

【효능·효과】

고혈압

【용법·용량】

성인: 아젤니디핀 8mg 또는 16mg를 1일 1회 아침식사 후 경구 투여한다. 1회 8mg으로 투여를 시작하고 증상에 따라 적절히 증감한다. 1일 최대 16mg를 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 임신부 또는 임신 가능성이 있는 여성
- 이 약의 성분에 과민증의 병력이 있는 환자
- 아졸게 항진균제(경구제, 주사제)/이트라코나졸, 미코나졸, 플루코나졸, 포스플루코나졸, 보리코나졸, HIV프로테아제 억제제(리토나비르 함유제제, 사퀴나비르, 인디나비르, 네비라비르, 아타자나비르, 포스프레나비르, 다루나비르 함유제제, 코비시스타트 함유제제, 올비타스비르·파리타프레비르·리토나비르를 투여하는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 신기능 장애 환자
 - 중증의 신장 기능 장애가 있는 환자
혈압 강하로 인해 신장 기능이 저하될 가능성이 있다.
- 간 기능 장애 환자
 - 중증의 간 기능 장애가 있는 환자
중증의 간 기능 장애가 있는 환자를 대상으로 한 임상 시험은 실시되지 않았다.
- 고령자(8. 고령자에 대한 투여 참조)

3. 이상반응

다음 이상반응이 나타나는 경우가 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 확인되면 투약을 중지하는 등 적절하게 대처한다.

- 중대한 이상반응
 - 간 기능 장애(빈도 불명), 황달(빈도 불명)
AST, ALT, γ -GTP의 상승 등이 동반되는 간 기능 장애가 일어나는 경우가 있다.
 - 방실 블록(빈도 불명), 동정지(빈도 불명), 서맥(빈도 불명)
어지러움, 휘청거림 등의 증상이 생길 우려가 있다.
- 기타 이상반응

	1~3% 미만	1% 미만	빈도 불명
괴민성	가려움, 발진	혈관 부종, 광선 과민성 반응	
정신 신경계	두통·두중증	기립성 저혈압, 휘청거림, 어지러움	졸림
소화기		변비	위부불쾌감, 오심, 복통, 설사, 저은 증식증, 구내염
순환기		동계, 안면홍조, 확산거림	
혈액		호산구 증가	
간	ALT 상승, AST 상승, LDH 상승	ALP 상승, 총빌리루빈 상승	γ -GTP 상승, 간기능 이상
비뇨기		BUN 상승, 요조지혈주 증가	크레아티닌 상승, 빈뇨
기타	요산 상승	총콜레스테롤 상승, CK 상승, 칼륨 상승, 칼륨 저하	관상동맥 이상 감각, (부유관, 불결관 등), 부종, 저림, 유미독수*

*저알부민혈증 환자에게 일어나기 쉽다.

- 이 약을 통한 치료 중에 인과관계는 명확하지 않지만 심근경색, 심부전, 부정맥(심방세동 등)이 나타났다고 보고되었다.

4. 일반적 주의

- 칼슘 길항제 투여를 갑자기 중지했을 때 증상이 악화될 사례가 보고 되었으므로 이 약의 휴약이 필요할 경우에는 서서히 감량한다. 또한 환자에게 의사의 지시 없이 복약을 중지하지 않도록 주의시킨다.
- 드물게 과도한 혈압 저하를 일으킬 우려가 있으므로 그러한 경우에는 감량 또는 휴약 등 적절한 조치를 한다.
- 혈압 강하작용으로 인한 어지러움 등이 생기는 경우가 있으므로 높은 곳에서의 작업, 운전 등 위험을 동반한 기계를 조작할 때에는 주의하게 한다.
- 상호작용
이 약은 주로 시트코를 P450 3A4(CYP3A4)로 대사된다.
 - 병용 금지(병용하지 말 것)

약물명 등	임상 증상·조치 방법	기전·위험 인자
아졸게 항진균제(경구제, 주사제) - 이트라코나졸, 미코나졸, 플루코나졸, 포스플루코나졸, 보리코나졸	이트라코나졸과 병용하여 아젤니디핀의 AUC가 2.8 배 상승하는 것으로 보고된다.	
HIV단백질분해효소 억제제 - 리토나비르 함유제제, 사퀴나비르, 인디나비르, 네비라비르, 아타자나비르, 포스프레나비르, 다루나비르 함유제제 코비시스타트 함유제제 - 엘비테그라비르/코트릭시타르/데노포비르 일라페나미드/코비시스타트, 코비시스타트/다루나비르	아젤니디핀의 작용이 증강될 우려가 있다.	이 약물들이 CYP3A4를 억제하여 아젤니디핀의 청소율이 저하될 수 있다.
올비타스비르, 파리타프레비르, 리토나비르	아젤니디핀의 작용이 증강될 우려가 있다.	리토나비르가 CYP3A4를 억제하여 아젤니디핀의 청소율이 저하될 수 있다.

2) 병용 주의 (병용에 주의할 것)

약제명 등	임상 증상·조치 방법	기전·위험 인자
타 감압제	과도한 강압을 일으킬 우려가 있다. 필요에 따라 다른 감압제 또는 아젤니디핀을 감량한다.	작용기전이 다른 감압제를 병용함으로써 약리 작용이 증강된다.
디곡신	디곡신의 Cmax가 1.5배, AUC가 1.3배 상승하는 것으로 보고된다. 필요에 따라 디곡신을 감량한다.	디곡신의 신배설(요배관 및 신장 외 배설)이 억제될 수 있다.
시메티딘 이베탄비메실산염 마크로라이드계 항생제 - 에리트로마이신, 클레리트 로마이신 등	아젤니디핀의 작용이 증강될 우려가 있다. 필요에 따라 아젤니디핀을 감량 또는 이 약물들의 투약을 중지한다.	이 약물들이 CYP3A4를 억제하여 아젤니디핀의 청소율이 저하될 수 있다.
심바스타틴	심바스타틴의 AUC가 2.0 배 상승하는 것으로 보고된다. 필요에 따라 아젤니디핀 또는 심바스타틴의 투약을 중지한다.	이 약물들이 CYP3A4를 경쟁적으로 억제하여 청소율이 서로 저하될 수 있다. 신장 기능 장애가 있는 환자는 특히 주의한다.
시클로스포린 벤조디아제핀계 약제 - 디아제팜 - 미다졸람 - 트리아졸람 등 경구 황제·난포 호르몬 - 경구 피임약 등	아젤니디핀 또는 이 약물들의 작용이 증강될 우려가 있다. 필요에 따라 아젤니디핀을 감량 또는 이 약물들을 감량한다.	이 약물들이 CYP3A4를 경쟁적으로 억제하여 청소율이 서로 저하될 수 있다.
탄도스피론 구연산염	아젤니디핀의 작용이 증강될 우려가 있다. 필요에 따라 아젤니디핀을 감량 혹은 탄도스피론 구연산염 투약을 중지한다.	세로토닌 수용체를 매개로 한 중추성 혈압 강하 작용이 감압 작용을 증가시킨다.
리팜피신 페니토인 페노바르비탈	아젤니디핀의 작용이 감약될 우려가 있다.	이 약물들의 대사 효소 유도 작용으로 아젤니디핀의 청소율이 증가될 수 있다.
지용 주스	아젤니디핀의 혈중 농도가 상승하는 것이 보고되었다. 감압 작용이 증강될 우려가 있으므로 아젤니디핀의 복용 중에는 지용 주스를 음용하지 않도록 주의한다.	지용 주스에 포함된 성분인 CYP3A4에 의한 아젤니디핀의 대사를 억제하여 청소율이 저하될 수 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임신부에 대한 투여

임신부 또는 임신 가능성이 있는 여성에게는 투여해서는 안 된다. 동물실험(랫트)에서 임신 전~초기 투여 시 착상 전 및 착상 후 배아 사망을 증가, 출산자의 체중 저하, 임신 기간 및 분만 시간 연장이 확인되었다. 임신 말기 투여에서는 임신 기간 및 분만 시간 연장이 확인되었다.

2) 수유부에 대한 투여

치료상 유익성 및 모유 수유의 유익성을 고려하여 수유를 계속하거나 중단할지 결정한다. 동물실험(랫트)에서 유즙으로 이행되는 것이 보고되었다.

7. 소아에 대한 투여

소아 등을 대상으로 한 임상시험은 실시하지 않았다.

8. 고령자에 대한 투여

8mg부터 투여를 시작하여 신중하게 투여한다. 일반적으로 과도한 강압은 바람직하지 않다고 본다. 뇌경색 등이 일어날 우려가 있다.

9. 임상검사치에의 영향

1) CAPD(지속적 외래복막투석) 시행 중인 환자의 투석 배액에 백탁 현상이 일어나는 것이 보고되었으므로 복막염 등과의 감별에 유의한다.

10. 적응상의 주의

PTP 포장 약제는 PTP 시트에서 꺼내 복용하도록 한다. PTP 시트를 잘못 섭취하여 딱딱한 모서리가 식도 점막을 찌를 위험을 일으켜 중격동염 등의 중증 합병증이 발생할 수 있다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.
- 이 약은 빛에 의해 착색되므로 개봉 후에는 어두운 곳에 보관한다.

【저장방법】 실리카겔 동봉 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관
【포장단위】 30정/피티캡(10정/PTP×3)

제조업체: (주)메디카코리아

경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96

제 조 자: (주)인트로바이오팜(전공정)

경기도 평택시 서탄면 마두길 104-12,
104-2 1동 1층(일부) 및 2층(일부)(보관소)
정우신약(주)(포장)
충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60

저희 메디카코리아 제품은 KGMP에 적합하게 철저한 품질관리를 통해서 제조됩니다. 혹시 사용기간이 경과되었거나, 유통과정 중 변질·훼손된 제품은 구입 경로를 통하여 교환해 드립니다.

- * 부작용 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223)
- * 피해구제 제도 전용 상담 전화번호: 14-3330
- * 첨부문서 작성일자 2022년 12월 01일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 약의 품질합성보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 메디카코리아 홈페이지(www.medicakorea.com)에서 확인할 수 있습니다.
- * 제품문의 및 상담은 메디카코리아(1522-1131)로 문의바랍니다.

MK2210101-H



메디카코리아
경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96