
일반의약품



[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분 :
  벤포티아민(티아민염산염(으)로서 49.89mg)(KP) ····· 69mg
  시아노코발라민(KP) ····· 0.5mg
  산화마그네슘(마그네슘(으)로서 211.05mg)(KP) ····· 350mg
  피리독신염산염(KP) ····· 50mg
  리보플라빈(KP) ····· 50mg
  토코페롤아세테이트(비타민E(으)로서 500IU)(KP) ····· 500mg
  유비데카레논(KP) ····· 5mg
  γ - 오리자놀(KP) ····· 5mg
- 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색5호
  첨가제(동물유래성분) : 숙신산젤라틴(소, 가죽안쪽)
  기타첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 백납, 산화티탄, 소르비톨액(비결정성), 에틸바닐린, 콩기름, 폴리소르베이트80

[성상] 노랑 내지 겨자색의 점조성 내용물을 함유한 적갈색의 장방형 연질캡슐

[효능 · 효과]

1. 다음경우의 비타민 B_1, B_2, B_6, E의 보급
   - 육체피로
   - 임신 · 수유기
   - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
   - 노년기
   - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
     · 각기
     · 눈의피로
     · 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
     · 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움)
2. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법 · 용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 2회 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
   1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
   2) 만 12개월 미만의 젖먹이
   3) 심한 증상의 신부전 환자
   4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
   5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
   1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
   2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
   1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
   2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
   3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
   4) 신장장애 환자
   5) 저단백혈증 환자
   6) 임부
   7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
   8) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
   1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
      - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 붉은 변, 붉은 빈혈, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
   2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
   3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈전 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
   4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
   5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B_{12}를 1일 10 ㎍이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
   6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
   7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 사용(복용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
   8) 우발적으로 과량복용 한 경우
   9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
   2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
   3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
   4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
6. 저장상의 주의사항
   1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
   2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
   3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[유효기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 60캡슐(10캡슐/PTP포장x6), 120캡슐(10캡슐/PTP포장x12)

[소비자상담실] 080-260-0033

[제조의뢰자] **(유)한풍제약** / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301 1~3층, 5층. 봉동로 705

[판매원] **(주)녹십자** / 충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 586 TEL.080-260-0033

[제조자] **(주)서흥** / 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 자세한 사항은 식품의약품안전처 의약품안전나라(https://nedrug.mfds.go.kr)를 참조하십시오.
- 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)