

락토더블캡슐

락토바실루스카제이변종람노수스의동결건조배양물

조제용 일반의약품

Lactodouble Cap.

원료약품 및 그 분량 1캡슐 중

- 유효성분 : 락토바실루스카제이변종람노수스의동결건조배양물(별규) 200mg
(활성물질용량 : 생균수로서 4.0×10^8 CFU)
- 첨가제(동물유래) : 스테아르산마그네슘(소, 우지)
- 기타첨가제 : 캡슐, 톨크

성상

크림색가루가 들어있는 상하 흰색의 불투명 경질캡슐제

효능·효과

장내균총의 정상화에 의한 정장 및 설사증상의 개선

용법·용량

성인 1일 1~4캡슐을 개봉하지 않고 물과 함께 삼킨다.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이약을 복용하지 말 것

- 1) 이약의 주성분들 중 하나에 과민증 환자
- 2) 동물에서 최기형성이 보고된 자료는 없다. 임상시험에서 현재까지 특별한 기형 또는 태아독성효과가 보고되지 않았다. 그러나, 임신 중 이약에 노출된 경우, 모니터링을 한다해도 모든 위험을 배제시키기에는 불충분하므로 의사의 지시에 따르십시오

2. 기타 이약 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법용량을 잘 지킬 것
- 2) 투여 2일 후에도 설사가 지속되는 경우에는 치료를 재고하며, 경구용 재수화 액제또는 정맥 내 투여에 의한 재수화의 필요성이 고려되어야 한다.
- 3) 환자는 다음과 같은 경우에 대한 필요성을 알아야 한다.
 - ① 설사로 인한 수분손실을 보충하기 위해, 염분 또는 당을 함유하고 있는 음료를 충분히 마셔 재수화 한다. (성인 1일 평균 수분 요구량은 2리터)
 - ② 설사 시 식사를 계속하는 경우,
 - 가) 일부 음식 및 특히 생 음식, 과일, 야채, 매운 음식 및 냉동된 음식 또는 음료를 먹지 않는다.
 - 나) 주로 익힌 고기 및 밥을 먹는다.

3. 저장상의 주의사항

- 1) 이 약은 용기 개봉 후에는 3개월 이내에 사용되어야 합니다.
- 2) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 3) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
- 4) 오용을 막고 품질을 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

저장방법 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

포장단위 90캡슐/병, 300캡슐/병

제조사 코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

- 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)
- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
- 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사·약사와 상담 후 사용하십시오.
- 본 제품의 품질관련 문의사항은 080-581-5800으로, 기타 제품관련 문의사항은 (02)714-0091로 연락하시기 바랍니다.

- 만약 구입시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에게만 교환하여 드립니다.
- 본사는 제조물 책임법 시행에 따라 고객상담 전용창구(전화 080-719-2000)를 운영하고 있습니다.

- 최신의 정보 확인방법** : 이 첨부문서 작성년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.kuhnibiopharm.com)에서 확인할 수 있습니다.
- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.