



하루 한 번 복용으로 간편하게! 임팩타민원스정

임팩타민원스정은 육체 피로를 위한 고함량 비타민B군 8종과
항산화 성분인 비타민C, 비타민E, 셀레늄 등이 함유되어
하루 한 번 간편히 복용하는 고함량 활성비타민 제품입니다.

특 장 점

1. 고함량 활성형 비타민B₁ (벤포티아민) 120mg 함유¹
2. 비타민D 1,000 I.U, 마그네슘 함유
3. 활성산소 케어에 도움을 주는 항산화 성분(비타민C, 비타민E, 셀레늄) 함유²

Ref. > 1. Greb A, et al. Int J Clin Pharmacol Ther. 1998;36(4):216-221. 2. Lawrence J et al. FASEB JOURNAL, 1987;1:441-445.

효능·효과



육체피로
일이 부족 많아져
자도 자도 피로하신 분



신경통/관절통(어깨결림)
목, 어깨가 뭉치고
걸리는 분



눈의피로
컴퓨터에 스마트폰까지
눈이 침침하고 피로하신 분

원료약품 및 그 분량 - 1정 중 -

■ 유효성분	산화아연(KP)(아연으로서 24mg)	30mg
벤포티아민(비타민B ₁)(KP)(티아민염산염으로서 88.77mg)	120mg	
리보플라빈(비타민B ₂)(KP)	100mg	
니코틴아미드(비타민B ₃)(KP)	50mg	
판토텐산칼슘(비타민B ₅)(KP)	100mg	
피리독신염산염(비타민B ₆)(KP)	50mg	
시아노코발린100배산(비타민B ₁₂)(별규)(시아노코발린으로서 500µg)	50mg	
콜린타르타르산(별규)	25mg	
이노시톨(KP)	25mg	
d-비오틴(USP)	0.25mg	
폴산(엽산)(KP)	0.5mg	
아스코르브산과립(97%비타민C)(별규)(아스코르브산으로서 30mg)	30.93mg	
농축폴레칼시페롤(비타민D)(EP)(비타민D로서 1000 I.U)	10mg	
도코페놀아세이트 50%(비타민E)(EP)(비타민E로서 10 I.U)	20mg	
셀레늄함유건조효모(KP)(셀레늄으로서 25µg)	46.29mg	
우르소데옥시콜산(UDCA)(JP)	15mg	
산화마그네슘(USP)(마그네슘으로서 30mg)	50mg	
■ 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유)		
■ 기타첨가제: 감정무수규산, 규화미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스카멜로오스나트륨, 크로스포비돈, 탈철도 노란색(59Y628), 탈철도 클리어(92C069), 탈철도 흰색(93W145), 히드록시프로필셀룰로오스		

효능·효과

1. 다음 경우의 비타민D, E, B₁, B₂, B₆, C의 보급
—육체피로 —임신·수유기 —병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시 —발육기 —노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
— 뼈, 이의 발육불량 —구루병의 예방
— 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 — 각기 — 눈의피로
3. 아연의 보급

용법·용량 만 8세 이상 및 성인: **1일 1회, 1회 1정** 복용하십시오.

성 상 미황색 내지 황색의 타원형 필름코팅정



사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia): 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태(환자분, 유육종증(sarcoidosis): 원인을 알 수 없는 전신 염증질환, 신장질환 환자분) 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자분 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자분 5) 심한 증상의 신부전 환자분 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자분에게는 투여하면 안 됩니다. 7) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자분 8) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자분
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우유)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 만 1세 미만의 젖먹이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자분 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이 4) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 5) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다. ② 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자분 7) 심장·순환기계기능 장애 환자분 8) 신장장애 환자분 9) 저단백혈증 환자분 10) 통풍환자분 또는 신장결석이 있는 환자분 11) 신장결석 병력이 있는 환자분 12) 일부 13) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 혈장형 등 지방대사 이상 환자분 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자분
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우, 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적충혈등이 나타날 경우, 붉은 변, 붉은 분점, 부종, 신장기능장애, 중추신경계 기능저하, 피부염, 딸·호흡기 약화, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부)부종, 저혈압, 폐부종(부기) 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 임이 침범 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있습니다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다. 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다. 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다. 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다. 8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 9) 항알도스테로제, 트리안테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 10) 우발적으로 과량복용 한 경우 1) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오. 3) 각종 요감사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다. 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사지에 영향을 줄 수 있습니다. 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오. 6) 지방과무하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정수용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.
6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30°C)보관 하십시오.

포장단위 30정/병, 60정/병, 120정/상자(60정/병)×2, 180정/병, 500정/병

사용기간 제조일로부터 24개월

- ※ 내부 포장에 파손되어 있으면 복용하지 마십시오.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 부작용보고 및 피해구제신청: 한국의약품안전관리원(14-3330, 1644-6223)

제조자: (주)대웅제약 경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14



대웅제약
경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-14

작성 연월일: 2022. 07. 28

※ 이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다.
H00 2301128