



역류성식도염, 위염 및 위·십이지장궤양 증상 개선제

라미나지[®]츄어블정 200mg

| 알긴산나트륨 |

105정

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사와 상의하십시오. 상단 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
때때로 설사, 변비 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
2. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
위산결핍증에서는 겔화(gelation)가 이루어지지 않아 이 약의 효과가 떨어집니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1-30°C) 보관

[포장단위] 105정/병

[제조판매자] (주)태준제약

본사 : 서울특별시 용산구 대사관로31길 8
공장 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 109-30

www.taejoon.co.kr

라미나지[®]츄어블정 200mg

| 알긴산나트륨 |

[원료약품 및 그 분량] 1정(620밀리그램) 중

-유효성분: 알긴산나트륨(NF) ... 200.0mg

-동물유래성분: 스테아르산마그네슘(소, tallow oil),
유당수화물(소, 우유)

-기타첨가제: D-만니톨, 박하향분말 ZD-7741, 수크랄로스,
스트로베리미크론, 시트르산나트륨수화물,
시트르산수화물, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘,
크로스포비돈, 폴리에틸렌글리콜400,
폴리에틸렌글리콜4000

[성상] 연한갈색 반점이 있는 백색-회백색의 납작한 원통형의
츄어블정

[효능·효과] 1. 다음 질환의 지혈 및 자각증상의 개선

: 위·십이지장궤양, 미란성위염

2. 역류성식도염의 자각증상 개선

[용법·용량] 위·십이지장궤양 및 미란성 위염의 지혈 및
자각증상 개선과 역류성 식도염의 자각증상 개선
성인 및 만 3세 이상의 소아:
알긴산나트륨으로서 보통 1회 1~3g(이 약 5정
~15정)을 1일 3~4회 공복에 경구투여합니다.
복용 시 삼키기 전 충분히 씹어 복용합니다.

- ※ 의약품을 사용하기 전에 표시사항을 주의 깊게 읽어야 하며, 표시사항을 꼭 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 구입시, 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환해드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 표시사항에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원 (www.drugsafe.or.kr) → 의약품유해사례보고에 알려주십시오.
- ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 소비자문의 : (주)태준제약 CS팀 (02)799-0271
- ※ 이 표시사항의 작성년월일은 2022년 08월 08일입니다. 작성년월일 이후 변경된 내용은 태준제약홈페이지 (www.taejoon.co.kr)나 전화번호 [02)799-0271] 에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 작성년월일은 제품의 사용기한과는 무관합니다.

TAEJOON 태준제약