

■ ■ ■ 의약품은 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

일반의약품

히팅플러스정(카페인무수물)

졸음예방·졸음방지제

● 원료약품 및 분량 1정 중

- 유효성분 : 카페인무수물(KP)..... 50mg
- 첨가제(타르색소) : 황색5호
- 기타첨가제 : 규화미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 오렌지미크론, 레몬미크론, 경질무수규산, 스테아르산마그네슘

● 성 상 연한 주황색의 원형 정제

● 효능·효과 졸음

● 용법·용량 성인 : 카페인무수물로서 1회 100~300mg를 1일 1~3회 경구 투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

● 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람에는 신중히 투여할 것

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 위궤양 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 심질환 환자
- 3) 녹내장 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것

1) 과량투여에 의해 진전(떨림), 어지러움, 심계항진(두근거림), 불면, 불안, 동공산대, 부정맥, 기외수축(조기수축), 빈맥(빠른맥), 이명(귀울림) 등의 증상이 나타날 수 있다.

2) 기타 : 만성 녹내장을 악화시킬 수 있다.

4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 중추신경계의 심한 흥분상태는 치오펜탈나트륨과 같은 단시간형 바르비탈계 약물을 투여함으로써 조절될 수 있다.
- 2) 이 약은 태반을 통과하여 모유중으로 쉽게 이행되므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 장기 연용(계속 사용)하지 않는다.
- 3) 일반적으로 고령자(노인)에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 용량을 감량(줄임)하는 등 신중히 투여한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

● 저장방법 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

● 사용기간 제조일로부터 36개월

● 포장단위 500정/병

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하세요.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.pharvis.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

※ 소비자상담실 : 02)579-6262

본 의약품은 우수 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

작성일자 : HPT 2022.07.20 (I-220720)