

# 이부브롬 연질캡슐

효과빠른 진통소염제(이부프로펜+파마브롬)



## [원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분 : 이부프로펜(KP) ..... 400mg  
파마브롬(USP) ..... 50mg
- 첨가제(동물유래) : 젤라틴(기원동물: 소, 사용부위: 가죽)
- 기타 첨가제 : 농글리세린, 부분탈수엑산소르비톨, 부틸레이티드히드록시톨루엔, 수산화칼륨, 에틸바닐린, 정제수, 치자청색소, 폴리소르베이트80, 폴리에틸렌글리콜600

## [성상]

미황색(연노랑) 내지 연한 청색의 투명한 내용물을 함유한 청색의 투명한 정방형 연질캡슐(이부브롬)

## [효능·효과]

1. 두통, 치통, 발치후(이를 뽑은후) 동통(통증), 인후(목구멍)통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 건통(어깨결림), 타박통, 골절통, 염좌통(뱀통증), 월경통(생리통), 외상(상처)통의 진통
2. 오히려(출고) 떨리는 증상, 발열시의 해열

## [용법·용량]

만 15세이상 이상 및 성인 : 1일 1~3회, 1회 1캡슐  
공복(빈) 속시를 피하여 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

## [사용상의 주의사항]

### 1. 경고

- 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.

### 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만3개월 미만의 영아(갓난아기)

### 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 해열진통제, 감기약, 진정제

### 4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 수도 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
- 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 4) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 고령자(노인)
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 7) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 8) 속쓰림, 위부(상복부)불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 9) 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이뇨제를 복용하는 사람

### 5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우  
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화관출혈, 위부(상복부)불쾌감, 어지러움, 부종(부기)
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
  - ① 아나필락시스(과민성쇼크) : 복통후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
  - ② 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 중증성표피괴사증후군(리엘증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신(온몸)피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.
  - ③ 천식

- 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

### 6. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

### 7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 복용시에는 음주하지 말 것.

### 8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

### [저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

### [포장단위]

10캡슐/피티피

### [사용(유효)기간]

제조일로부터 36개월

### [제조회사]

태극제약(주) : 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

### [제조자]

(주)서흥 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

- \* 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- \* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- \* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
- \* 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- \* 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 및 QR 코드를 참조하십시오.

☎ 소비자상담전화 : 080-300-8282


의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 **한국의약품안전관리원**에 할 수 있습니다.

**[신청방법]** ☎ 1644-6223, 14-3330 | 🌐 [karp.drugsafe.or.kr](http://karp.drugsafe.or.kr)

**[신청대상]** 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족

**[보상범위]** 사망일시보상금, 장례비, 장애일시보상금, 진료비

첨부문서 작성 연월일 : 2022. 09. 20



1. 앞부분을 그림과 같이 한쪽을 강하게 눌러 호일로부터 약을 꺼냅니다.
2. 개봉 후 즉시 복용하시고, 포장용 벗긴 상태로 보관하지 마십시오.
3. 어린이보호용 안전용기 포장입니다. 개봉 시 강한 충격으로 약의 모양이 변형될 수 있습니다.