

성장기 어린이 영양제 키드칼 플러스



일반의약품
KGMP적격업체
분류번호:03190 8 806581 084109

● 츠어불정 ●

【원료약품 및 분량】 1정(1000mg) 중

유효성분:

무수인산수소칼슘(인으로서 22.8mg, 칼슘으로서 29.5mg)(JP)	100mg
제피아스코르브산(아스코르브산으로서 50.0mg)(별규)	51.5mg
판토텐산칼슘(KP)	3mg
폴리칼시페롤(비타민D로서 250IU)(동물유래성분: 양, 양모)(EP)	2.5mg
시아노코발라민 1000배산(시아노코발라민으로서 3μg)(KP)	3mg
폴산(KP)	0.1mg
글리세로인산마그네슘(마그네슘으로서 1.9mg)(BP)	15mg
니코틴산아미드(KP)	5mg
피리독신염산염(KP)	1.35mg
레티놀아세테이트과립(비타민A로서 1000IU)(EP)	2mg
리보플라빈포스페이트나트륨(KP)	1.15mg
티아민질산염(KP)	1mg
토코페롤아세테이트2배산(비타민E로서 5IU)(KP)	10mg
산화아연(아연으로서 2mg)(KP)	2.49mg

【첨가제】 • 첨가제(동물유래성분): 유당(젖당)수화물(소, 우유) • 기타첨가제: 경질무수규산, 딸기향분말, 수크랄로스, 스테아르산마그네슘, 시트르산수화물, 자일리톨, 포도당, 폴리메틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

【효능·효과】 ○ 다음 경우의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후) - 발육기 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 눈의 건조감 완화 • 야맹증(밤에 잘 못 보는 증상) • 뼈, 이의 발육불량 • 구루병의 예방

【용법·용량】

- 12세 이상 및 성인: 1일 2회, 1회 2정 ▪ 만 36개월 이상 ~ 12세 미만: 1일 2회, 1회 1정
- 식후 입안에서 녹이거나 씹어서 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A 결핍증 환자는 제외).

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 만 12개월 미만의 젖먹이
- 신장(콩팥)결석 환자
- 심한 증상의 신부전 환자
- 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 만 1세 미만의 젖먹이

- 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria: 요(소변)중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)
- 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증세가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에서 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

② 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.

- 심장·순환기계기능 장애 환자
- 신장(콩팥)장애 환자
- 저단백혈증 환자
- 감염배당체를 투여 중인 환자
- 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 신장(콩팥)장애 병력이 있는 환자
- 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구토, 기려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 설사, 위부(상복부)불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장 박동 정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 폐부종(부기)
- 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 폴산이 부족한 환자에서 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈약성증) 위험을 높일 수 있다.
- 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께) 복용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 우발적으로 과량복용 한 경우
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.
- 각종 요(소변)검사에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 요(소변)를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

7. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 120 정/병, 240 정/상자(120정/병×2)

【성 상】 흰색 ~ 미황색의 원형 정제

【제조원】 (유한)종제약 / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301 1~3층, 5층. 봉동로 705

【판매원】 광동생활건강(주) / 서울특별시 서초구 서초대로50길 94, 5층 TEL 080-024-0030

※ 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해드립니다.

※ 의약품은 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의 깊게 읽어와야 하며 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

※ 자세한 사항은 의약품안전나라(<https://medrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

첨부문서 작성일 : 2023년 04월 19일