

고함량 콘드로이틴 600mg + 활성비타민B 복합제

메가본



【유효성분】 이 약 1정(120 mg) 중

- 콘드로이틴설페이트나트륨(KP) 600 mg
- 푸르셀라이민(KP) 60 mg
- 니코틴아미드(KP) 60 mg
- 아스코르빈산(KP) 50 mg
- 피리독신염산염(KP) 25 mg
- 시아노코발라민1000배산(KP) 20 mg
(시아노코발라민으로서 20 µg)
- 이노시톨(KP) 20 mg
- 판토텐산칼슘(KP) 15 mg
- 리보플라빈(KP) 12 mg
- γ-오리자놀(KP) 5 mg

【효능·효과】

1. 다음경우의 비타민 B1, B2, B6, C 의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력회복시

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
- 각기, 눈의피로
- 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】

만 8세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 만 3개월 미만의 젖먹이

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

1) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
- 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감
- 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다
- 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능

적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

- 4) 흡산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 6) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】

45정/병, 90정/상자(45정/병x2), 60정/병, 120정/상자(60정/병x2)

【저장방법 및 사용기간】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36 개월

【첨가제】

미결정셀룰로오스, 스테아라산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탭실드칼색(59B346), 탭실드클리어(19C333)

【성 상】 갈색의 장방형 필름코팅정

- ※ 이 문서는 본제를 사용하시에 필요한 주의사항을 기재한 것으로 본제와 같이 보관하십시오.
- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품 통합정보시스템 (<http://medrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 본 제품에 대한 의문사항은 당사 소비자 상담실 031-319-1975로 문의하십시오.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국약품안전관리원에 피해구제 신청을 할 수 있습니다. ☎ 14-3330 : 피해구제 상담 ☎ 1644-6223 : 의약품 부작용 신고 · 피해구제 상담
- ※ 첨부문서 개정연월일: 2022. 11. 18

【판매처】 동화약품(주) / 충청북도 충주시 충주산단로 167

【제조처】 동인당제약(주) / 경기도 시흥시 경제로 59