

DQ

2XB

'강한 피로엔 강한 비타민'

고함량 활성비타민 B1 베포티아민 130mg 일반의약품 최대치 CoQ10 10mg로 육체피로를 강하게 빠르게

투엑스비디큐^정

[원료약품 및 그 분량] 1정(893.0밀리그램) 중

■ 유효성분 :

폴산 (KP)	500 mcg
비오틴 (USP)	500 mcg
시아노코발라민 (KP)	500 mcg
산화아연 (아연으로서 24.1 mg) (KP)	30.0 mg
유비데카레논 (KP)	10.0 mg
셀레늄함유건조효모 (셀레늄으로서 13.5 mcg) (KP)	25.0 mg
리보플라빈 (KP)	50.0 mg
이노시톨 (KP)	50.0 mg
피리독신염산염 (KP)	50.0 mg
베포티아민 (티아민염산염으로서 94.0 mg) (KP)	130.0 mg
니코틴산아미드 (KP)	20.0 mg
아스코르브산 (KP)	100.0 mg
감마오리자놀 (KP)	10.0 mg
우르소데옥시콜산 (KP)	30.0 mg
토코페롤아세테이트2배산 (비타민E로서 10 I.U) (KP)	20.0 mg
콜레칼시페롤농축분말 (비타민D로서 1,000 I.U) (EP)	10.0 mg
판토텐산칼슘 (KP)	50.0 mg

■ 기타첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스포비돈, 탭실드흰색(19W623), 탭실드갈색(99B917)

[성 상] 갈색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

다들경우의 비타민 D, E, B1, B2, B6, C 의 보급 ■ 육체피로 ■ 임신·수유기 ■ 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 ■ 발육기 ■ 노년기

이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. ■ 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방

다들 증상의 완화 ■ 신경통 ■ 근육통 ■ 관절통(요통, 어깨결림 등) ■ 각기 ■ 눈의피로 ■ 구각염(입꼬리염) ■ 구순염(입술염) ■ 구내염(입안염) ■ 설염(혀염) ■ 습진 ■ 피부염

아연의 보급

[용법·용량]

만 8 세 이상 어린이 및 성인 : 1 일 1 회, 1 회 1 정을 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 3) 만 12개월 미만의 젖먹이 4) 신장결석 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 만 1세 미만의 젖먹이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이 4) 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태) 5) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. 6) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 7) 심장-순환기계기능 장애 환자 8) 신장(콩팥)장애 환자 9) 저단백혈증 환자 10) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자 11) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상급 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 피부염, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소아장애, 상복부(배부분)통증, 저혈압, 폐부종(부기) 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E 를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상 (neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. 7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 8) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 9) 우발적으로 과량복용 한 경우 10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것. 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 4) 요를 황색으로 변화시켜 하여 임상감사치에 영향을 줄 수 있다. 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 60정/병, 120 정/상자 (60 정/병 × 2), 200 정/상자 (1정/포 × 200)

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[설명서작성년월일] 2022.08.19

구입시 사용기간이 경과하였거나 변질 또는 오손된 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상 개설자에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입 유통 경로를 통해서 반송하여 주시기 바랍니다. 소비자 문의는 본사 마케팅부 (수신자부담:080-549-0002)에서 상담해 드리며, 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은 백암공장 품질경영본부 (전화:080-332-0002)로 연락바랍니다. 제품 사용 후 부작용 (이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원 (1644-6223) 혹은 의약품 피해구제 전용 상담번호 (14-3330)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다. *설명서작성년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 (www.jeilhs.co.kr) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.*

[제조·의뢰원]



제일 헬스사이언스 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7 B동

[제조원]

메디스제약(주) 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170