

150mm*156mm

일반의약품

로라포신캡슐(은교산)

이 약을 복용하기 전에 사용설명서를 주의 깊게 읽으시고, 약과 함께 보관하십시오.

[원료약품 및 분량] 1캡슐(616mg) 중

• 유효성분			
금은화(KP)..... 710mg	길 경(KP)..... 426mg	형 개(KP)..... 284mg	영양각(생규)..... 22mg
연 교(KP)..... 710mg	감 초(KP)..... 426mg	두 시(생규)..... 356mg	
박 하(KP)..... 426mg	담죽엽(생규)..... 284mg	우방자(KP)..... 356mg	

• 유효성분(동물유래성분) : 영양각(영양, 뽕) (이상 건조엑스로서 500mg)

• 기타첨가제 : 알긴산나트륨, 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 캡슐(상부, 하부 담갈색)

[성상]

암갈색의 분말이 든 상부, 하부 담갈색의 경질캡슐

[효능·효과]

감기로 인한 목구멍 통증, 목마름, 기침, 두통

[용법·용량]

보통 성인 1회 2캡슐, 7~14세 1캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간(식사때와 식사때 사이)에 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 5세 미만의 영(젖먹이)·유아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장애 또는 신장애(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기) 환자
- 4) 몸이 허약한 환자(체력이 쇠약해진 환자, 몸이 약한 환자)
- 5) 위장이 허약한 환자
- 6) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 7) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 9) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 뺨임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
- (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- (3) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
- (4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역 등
- 2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것.
- 4) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 5) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한]

제조일로부터 36개월

[포장단위]

12캡슐(12캡슐/PTP×1)

- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- ※ 구입 시 사용(유통)기한이 경과하였거나 변질, 변패, 오염되었거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.
- ※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 셀메드 홈페이지(<https://cellmed.com>) 또는 의약품 안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해 구제 신청할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

제조사: 주식회사 제이비케이랩 전라남도 화순군 동면 동농공길 17
작성 연월일: 2024.07.11