

※ 이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 반드시 약과 함께 보관하십시오.

일반의약품

트리탄정 150밀리그램 Tritan Tab. 150mg

[트리메부틴말레산염] [Trimebutine Maleate]

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중

- 유효성분 : 트리메부틴말레산염(KP) 150mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탈크, 포도당

[성상] 흰색의 원형 정제

[효능·효과]

1. 주효능 효과

- 1) 식도역류 및 열공헤르니아, 위 십이지장염, 위 십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통, 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 3) 소화 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애 (변비, 설사)

[용법·용량]

성인 : 말레인산트리메부틴으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 부작용

- 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수 있다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
- 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통등이 나타날 수 있다.
- 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.
- 5) 과민증 : 드물게 발진등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

2. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

3. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 30정/병, 500정/병

[제조번호] 용기에 별도표시

[사용기한] 제조일로부터 36개월

※ 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 반드시 의사·약사와 상담 후 사용하십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하신 경우 병·의원, 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 최초작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.mcultypharma.com) 또는 전화(031-378-1460)를 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국 의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330, karp.drugsafe.or.kr)에 할 수 있습니다.

최초작성일자 : 2022.09.13

TRT-2209-00



[제조의뢰자] 맥널티(제약주)

충청남도 천안시 서북구 성환읍 읍금3길 46



[제조사] 한국유니온제약(주)

강원도 원주시 문막읍 문막공단길 246

강원도 원주시 문막읍 문막공단길 247 A동 1층, 2층, C동, D동(시점동) 2층, 3층, E동(원제보관소)