

※ 의약품용을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

일반의약품
KGM® 제약업제

하루 한 알 관철건강 탑콘도르 600 정 고함량 콘드로이틴 600 mg



【유효성분 및 그 분량】1정 중

■ 유효성분 : 콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	600mg
리보플라빈부타이레이트(KP)	6mg
루로실타이민(KP)	60mg
니코틴아미드(KP)	60mg
판토텐산칼슘(KP)	15mg
피리독신염산염(KP)	25mg
아니사롤(KP)	20mg
시아노코발라민 1000배산(KP)(시아노코발라민으로서 20μg)	20mg
콜마오리자놀(KP)	5mg
폴리타르타르산염(USP)	20mg

■ 동물유래성분 : 유당(젖당)수화물(소, 우유)

■ 기타첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탭탈드 갈색 9187 49, 히드록시프로필셀룰로오스, 히드로록소

【성상】

갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆의 보급

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
 - 각기
 - 눈의 피로

【용법·용량】

만 8세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자
- 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 모도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 안산염, 갑상염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 감광성피부를 투여 중인 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 뱀, 설사, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 어지러움, 얼굴·다리 종창(부기), 홍반(붉은반점), 두드러기, 습진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종(부기)-수분저류(신부전 또는 심부전 환자)
- 2) 피리독신을 1일 500 mg - 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병성 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 3) 몸산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(모도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 모도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 5) 대장암으로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 7) 항알도스테론제, 트라이아테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 장해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
- 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】

제조일로부터 36개월

【포장단위】

90정/상자(45정/박스)

【허위광고의 주의사항】

- ※ 구입 시 사용(유효)기한이 경과되어거나 변질, 변색 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서 제정일자(2022년 10월 26일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 본 제품 사용으로 인한 부작용을 피해구제 신청은 한국약물안전관리원(T.14-3330(상담) 또는 1644-6223 (신고 및 상담)에서 할 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ※ 소비자 상담실 070-5020-3319

【제조회사】

(주)한국비엔비 / 세종특별자치시 소정면 소정산단복로7

【제조자】

(주)노바엘헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산단로 16-53

【판매자】

GC녹십자 / 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107