

콘디에스^정

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

[제품명] 콘디에스정

[원료약품 및 그 분량] 1정(1,134mg) 중

■ 유효성분

감마오리자놀(KP)	5mg
니코틴아미드(KP)	60mg
리보플라빈부티레이트(KP)	6mg
시아노코발라민1000배산(KP)(시아노코발라민으로서20μg)	20mg
이노시톨(KP)	20mg
콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	600mg
콜린타르타르산염(USP)	20mg
판토텐산칼슘(KP)	15mg
푸르실티아민(KP)	60mg
피리독신아민(KP)	25mg
■ 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소의 우유) ■ 기타 첨가제: 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탭실드칼색 91B749, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스	

[성상] 갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

- 다음경우의 비타민 B₁, B₂, B₆의 보급
- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
 - 각기·노의 개조

[용법·용량] 만 8세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 식후 복용
[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalciuria): 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자

2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

3) 만 12개월 미만의 젖먹이

4) 신장결석 환자

5) 심한 증상의 신부전 환자

6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 만 1세 미만의 젖먹이
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
- 4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자

6) 신장장애 환자

7) 저단백혈증 환자

8) 감성배당체를 투여 중인 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부서류를 소지할 것.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
구역, 구토, 묽은 변, 설사, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 어지러움, 얼굴·다리 종창(부기), 흉만, 두드러기, 습진, 발진, 반구진성 발진, 가려움, 부종·수분저류(신부전 또는 심부전 환자)

2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

3) 흡산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

5) 대량투여로 인하여 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈 심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.

7) 항알도스테론제, 트리암테넨과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것

8) 우발적으로 과량복용 한 경우

9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜질 것.

2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
또는 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 120정/상자(60정/병x2)

[제조자] 주식회사노바메헬스케어 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

[제조외국] 경남제약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 49

[소비자상담전화] 080-232-8600, www.kyungnampharm.com

※ 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거하여 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※ 기타 자세한 약품용 정보는 의약품통합정보시스템 "https://nedrugs.mfds.go.kr" → 의약품 등 검색"을 참조하시기 바랍니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

경남제약|주