

일반의약품

마그스타정 500정

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분: 락트산마그네슘수화물(마그네슘(으로서 48mg)(KP).....470mg
피리독신염산염(KP)..... 5mg
- 첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 전호화전분, 전분글리콜산나트륨, 포비돈K30, 스테아르산마그네슘, 탈크, 탭실드노란색(319Y1075)

【성상】 노란색 장방형 장용성 필름코팅정제

【효능·효과】 다음 경우의 비타민 B6의 보급

- 임신·수유기 -병중·병후의 체력저하 시
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【사용상의 주의사항】

1) 이 약 및 이 약에 포함된 성문의 과민반응 환자 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
3) 심한 증상의 신부전 환자 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다. 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 1) 인산염, 칼슘염 제제, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 심장·순환기

계기능 장애 환자 3) 신장장애 환자 4) 저단백혈증 환자 5) 임부 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 붉은 반점, 설사, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하 2) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 3) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 5) 우발적으로 과량복용한 경우 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【용법·용량】

- 마그네슘 결핍: 성인 1회 2정, 1일 3회, 식사 중 다량의 물과 함께 복용한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30도)보관

제조번호:

사용기한:

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※이 문안은 2022년 09월 30일 작성되었으며, 이후로 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 미래 제약 홈페이지 또는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
※제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생할 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
※소비자상담실: 02-521-2308 / www.miraepharmkorea.co.kr

【판매원】: (주)정진팜

주소: 충북 청주시 서원구 예체로91. 2층
043-260-3420

【제조사】

 **미래바이오텍**
WWW.MIRAEPHARMKOREA.CO.KR

경기도 안성시 공단2로 104



HDPE
두께>LDPE

(Rev.00)

27mmX20mm



8 806575 039825