

에리카정 500정

(아세트아미노펜, 에페드린염산염, 카페인무수물)



· 제조의뢰자: (주)일화 / 강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

· <https://www.ilhwa.co.kr>

· 제조자: ㈜노비엠헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 자식산업4로 16-53

일반의약품 【현료약품 및 분량 : 1정(368밀리그램) 중】

■ 유효성분: 아세트아미노펜(KP) ... 200.0mg, 에페드린염산염(KP) ... 25.0mg, 카페인무수물(KP) ... 25.0mg

■ 첨가제(타르색소): 적색3호

■ 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스티라산마그네슘, 이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 분홍색의 원형 정제

【효능·효과】 감기의 증상(인후통, 기침, 가래, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【용법·용량】 만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 1정 식후 30분에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 경고

1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2) 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농도증(급성 전신성 발진성 고름물집증(AGEP), 스티븐스 - 존슨 증후군(SSJS), 독성 표피 괴사증(TS)과 같은 중대한 피부 반응이

보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다.

3) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제제와 함께 복용하여서는 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람

2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람

3) 만3개월 미만의 영아

4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등을 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

전해가당제, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 나복약(비염용 경구제, 알미약, 알레르기용약)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것

1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 라이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것)

2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람

3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람

4) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람

5) 소변의 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 과민, 출혈문제를 가지고 있는 사람

6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

가 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨병, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)

8. 다음과 같은 기침이 있는 사람

출연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

발진·발적, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종, 어지러움, 불안, 떨림, 불면

2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우

① 속(아나필락시스): 복용후 바로 두드러기, 부종, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.

② 피부점막만종후군(스티븐스-존슨증후군, 중독성표피괴사증후군(리얼증후군)): 고열을 동반하고 발진·발적, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈·점막에 나타날 수 있다. ③ 천식 ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있다. ⑤ 간질성피염: 가침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.

3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 소아에 대한 투여

만2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 장기간 계속 복용하지 말 것. 3) 복용시에는 음주하지 말 것. 4) 비비발게 약을, 삼할게 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 다사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.

8. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용을 먹고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 500정/병 【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관 【사용(유효)기간】 제조일로부터 36 개월

※ 자체현 품목허가 또는 신고사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nadrug.mfds.go.kr>) 의약품등 정보 조회

※ 사용(유효)기간이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 우수약품 제조관리 및 품질관리기준(GMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 의약품은 약국게설지 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ◆ 소비자상담실: 080-388-3333 (수신자부담)

※ 본 의약품 사용시 이상반응이 발생할 경우 한국약품안전관리원(www.drugsafe.or.kr) 피해구제 상담(14-3330) 및 의약품 부작용 신고·피해구제상담(1644-6223)을 통해 피해구제 신청이 가능합니다.

※ 최신의 정보 확인방법: 이 첨부문서의 개정일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ilhwa.co.kr) 또는 전화 (03)550-0472-8 (주)일화 학술·개발부를 통해 확인할 수 있음

※ 제정연월일: 2022년 12월 12일

0436 LF 221200



HDPE
두께: LDPE

제조번호:

35 X 18mm

사용(유효)기한:

