

비사린정 1000정

(비사코딜, 도큐세이트나트륨)



- 제조회사: (주)일화 / 강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55
- <https://www.ilhwa.co.kr>
- 제조사: ㈜노비엠헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

일반의약품 【치료효과 및 분량: 1정(160밀리그램) 중】

- 유효성분: 비사코딜(KP) ... 5.0mg, 도큐세이트나트륨(USP) ... 6.0mg
- 첨가제(타르색소): 황색203호, 청색1호
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(간경한 소의 우유)
- 기타 첨가제: 마결정셀룰로오스, 스티아르산마그네슘, 카로복시메틸셀룰로오스칼슘, 톱실드 녹색 30G706, 톱실드 흰색 11W001, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 녹색의 원형 장용성 필름코팅정

【효능효과】

- 변비
- 변비에 따른 다른 증상의 원료: 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 지질

【용법·용량】

1회 1~3정 1일 1회 취침 시공복 시에 복용한다.

만 15세 이상 및 성인: 1회 1~3정
만 11세 이상~만 15세 미만: 1회 2/3~2정
다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
 - 장폐색(장지막힘) 환자
 - 만 7세 이하의 어린이
 - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.

제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 나트륨 제한식이를 하고 있는 사람
 - 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
 - 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우.
 - 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우.
- 가타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
 - 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다.
 - 복용 시 정제를 씹지 말 것.
 - 장기간 계속 사용 시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화 될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 1000정/병

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36 개월

- ※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 의약품등 정보 참조
- ※ 사용유효기간이 지난 의약품은 사용하지 마십시오
- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 의약품은 약국계설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ☎ 소비자상담실: 080-388-3333 (수신자부담)
- ※ 본 의약품 사용시 이상반응이 발생할 경우 한국의약품안전관리원(www.drugsafer.or.kr) 피해구제 상담(14-3330) 및 의약품 부작용 신고·피해구제상담(1644-6223)을 통해 피해구제 신청이 가능합니다.
- ※ 최신의 정보 확인방법: 이 첨부문서의 개정일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ilhwa.co.kr) 또는 전화 (031)550-0472-8 (주)일화 학술·개발부를 통해 확인할 수 있음
- ※ 제정연월일: 2022년 12월 12일

제조번호:

사용유효기간:



HDPE
투명·LDPE

35 X 18mm



0437 LG 221200